

Bavar.

1502

o

Baw.
1502^o

Kranz



<36633516090012

S

<36633516090012

Bayer. Staatsbibliothek

Bav. 1502^g

Uebersicht

der

Flora von München,

enthaltend

die in der Umgebung Münchens wildwachsenden
und verwilderten

Gefässpflanzen.

Zusammengestellt

von

C. Anton Kranz.

München 1859.

Druck und Verlag von Georg Franz.

376 229 A

Uebersicht

der

Flora von München.

enthaltend

die in der Umgebung Münchens wildwachsenden
und verwilderten

Gefäßpflanzen.



München 1859.

Druck und Verlag von Georg Reimer.

Seinem edlen theuern

Pathen und Gönner

dem k. b. Geheimrathe und Professor etc. etc.

Herrn Ritter v. Weissbrod

in aller Ehrfurcht und Dankbarkeit

gewidmet

von dem Verfasser.

Seinem edlen theuern

Patron und Gönner

dem k. k. Geheimrath und Professor etc. etc.

Herrn Ritter v. Weissbrod

in aller Ehrfurcht und Dankbarkeit

gewidmet

von dem Verfasser

Vorwort.

Welch grossen Werth genau ausgearbeitete Spezialfloren für die Pflanzengeographie haben, ist allen Botanikern längst bekannt; selbst kleinere Städte haben desshalb zum grösstentheil gut geschriebene vollständige Floren; München, Bayerns Haupt- und Residenzstadt, aber konnte bisher keine solche aufweisen *).

Gleichwol ist die Flora von München keineswegs so uninteressant. Die mannigfach abwechselnden Bodenverhältnisse, die bedeutende Höhenlage, die Nähe der Alpen und die Verbindung mit denselben durch einen Fluss, bedingen einen Reichtum der Vegetation, der seinesgleichen wol nur bei wenigen Städten Deutschlands wieder findet.

Ich habe darum vorläufig die bis jetzt um München sicher aufgefundenen, wildwachsenden und

*) Zuccarini's Flora von München — ein unvollendetes Werk vom Jahre 1829 — enthält, bei vielen unrichtigen Angaben, nicht die Hälfte der vorkommenden Pflanzen.

verwilderten Pflanzen mit Angabe des allgemeinen oder speziellen Standortes für hiesige Freunde und Jünger der Botanik zusammengestellt.

Damit aber auch auswärtige Freunde dieser Wissenschaft etwas mehr Nutzen daraus schöpfen möchten, gebe ich hier ein, freilich nur in den gröbsten Umrissen gezeichnetes, Bild des Areals — die Anlage des Ganzen gestattet es nicht anders.

Wenn ich von München aus mit einem Radius von $2\frac{1}{2}$ geographischen Meilen einen Kreis beschreibe, so erhalte ich nahezu das, was ich als Gebiet gelten liess; dadurch bekomme ich im Nordwest die Amper mit den sie begleitenden Hügeln und im Südwest den Würmsee als natürliche Grenzen; die vollständige Grenzlinie aber wäre durch folgende Orte zu ziehen: Dachau, Gunzenhausen, Eching, Pliening, Neufarn, Hohenbrunn, Höhenkirchen, Sauerlach, Deining, Starnberg, Unterpfaffenhofen und Olching.

Die Höhenlage dieses unseres Florengebietes steigt bis 2140 Pariser Fuss (Ludwigshöhe bei Dingharding) und fällt nicht unter 1490 Fuss (obere Brücke bei Ismaning); als Mittel ist wol 1700' anzunehmen.

Der mittlere Luftdruck in München beträgt nach Lamont 317^{mm}. 37; die mittlere Jahrestemperatur

5°. 85; die Wärme steigt im Sommer durchschnittlich bis $+ 23^{\circ}$. 7 und die Kälte geht im Winter bis $- 15^{\circ}$. 2 herab, so dass die jährliche Schwankung zwischen Wärme und Kälte 38° . gleich ist.

Die Quellentemperatur ist um München im Mittel um 1° . 33 höher als die Lufttemperatur.

West ist der herrschende Wind. — Die Menge der meteorischen Niederschläge ist im Mittel 364^{'''}. 81.

Unser oben bezeichnetes Gebiet nun ist von der Isar in einer Richtung von Südwest nach Nordost diagonal durchschnitten. Ihr Gefälle im Gebiet beträgt bei 250'. Von ihrem oberen Laufe bis Mariaeinsiedl bilden gegen 100' hohe Abhänge ihr Ufer. Bald mit herrlichen Buchen, bald mit feuchten Fichtenwäldern, bald mit Weiden und anderen Gebüsch bewachsen, bald in abschüssige Wiesen oder kahle Kiesgerölle und in steile Schuttconglomerate s. g. Nagelfluelfelsen übergehend, dazu von einer Menge kühler Quellen befeuchtet und von Schluchten — den reichlichen Fundstätten seltener Moose — durchzogen, bietet das anmuthige Thal eine mannigfache subalpinische Vegetation, und wird desshalb von den Freunden der Natur vor allen andern Gegenden am häufigsten besucht. — Viele Pflanzen unserer Flora finden nur hier die Bedingungen ihres Fortkommens. —

Bei Mariaeinsiedl schweift der linke Abhang in einem grossen Bogen von der Isar ab und verliert sich, nachdem er, ohne mehr von besonderem botanischen Interesse zu sein, die begrasten Anhöhen an der Theresienwiese gebildet hat, auf dem Marsfelde. Der Abhang am rechten Ufer begleitet zwar die Isar bis Ismaning, aber auch er gewährt, sobald er Harlaching hinter sich gelassen, kein sonderliches botanisches Interesse mehr.

So wie die beiden Abhänge den Fluss nicht mehr in sein enges Bett zwingen, ist es ihm gestattet, seine Ufer weiter auszubreiten und die Isarauen zu bilden. Es sind dieses grossartige Lager von Kalkkies und Flusssand, bald mit dichtem Erlen- (*A. incana* L.), Weiden- und Sanddorngestrüpp bewachsen, bald auch ihre blendend nackte Oberfläche zeigend. Oft tritt der Fluss über seine Ufer und überschwemmt das Land weithin; wenn hierauf das Wasser wieder zurückgeht, so lässt es mit dem Schlamme zugleich eine Menge Pflanzen und Samen von den Alpen zurück, die dann, da sie hier so ziemlich entsprechende Vegetationsbedingungen finden, auch weiter vegetiren, bis eine spätere Fluth sie wieder hinwegnimmt, um neue an ihre Stelle zu setzen. Auf diese Weise erhalten wir zwar stets neue Ankömmlinge für unsere Flora; aber die Cul-

tur, ihr grimmiger Feind, der die wüsten Isarauen in anmuthige Gärten für wandelnde Spaziergänger umschafft und den Fluss in ein immer engeres Bett eindämmt, setzt ihnen auch allmählig bescheidenere Grenzen. Die nördlichen oder unteren Isarauen sind zwar den oberen im allgemeinen gleich, haben aber bei weitem nicht den Reichthum an Pflanzenarten wie diese.

An Wasserpflanzen ist die Isar arm. Ihr grosses Gefäll, sowie die Armuth an Altwässern sind wol daran Schuld. Reicher an Wasserpflanzen ist die Würm, der Abfluss des Würmsees und besonders die A m p e r, der des Ammersees, weil sie minder schnell fliesst und häufiger Altwässer bildet. Sie ist von Hügeln, („nördliche Hügelreihe“) die grösstentheils aus quarzhaltigem Lehm bestehen, begleitet. Diese nördliche Hügelreihe ist theils mit schönen Fichten- und Tannenwäldern bewachsen, theils mit guten Aeckern, theils mit Wiesen und Sümpfen bedeckt. Da an ihrem Fusse sich überdiess das Dachauermoos hinzieht, so hat sie eine Reihe Pflanzen, welche sonst um München fehlen; es dürften dort wol auch noch manche neu für die hiesige Flora aufgefunden werden.

Den nördlichen Theil des Gebietes nimmt die G a r c h i n g e r h a i d e ein. Es ist dieses eine grosse

Ebene, die sich von Milbertshofen (1¼ Stunde von der Stadt) bis Freising erstreckt. Ihre östliche Grenze ist die Isar, ihre westliche das Dachauermoos, in welches sie zum Theil übergeht. Nur eine sehr dünne Lehmschichte deckt den kiesigen Boden, der eine magere Vegetation bedingt. Der nordwestliche Theil dieser Haide trägt kleine Föhrenbestände; ausserdem ragt nur hie und da ein Wachholdergebüsch über die in regelmässigen Reihen auf der Ebene hinziehenden Hochäcker — die Zeichen einstiger Cultur — hinaus. Aber auch gegenwärtig sucht man die Haide wieder zu bebauen; Strecken, welche früher nur wenig schlechtes Heu abwarfen, sind nun blühende Aecker. Auf den Brachen solcher Felder erfreut sich der Botaniker des gigantischen Wuchses der sonst schwächtigen Haidebewohner.

Mächtigen Einfluss auf die Haide übt die Feuchtigkeit des Jahres. In einem trockenen Sommer sucht der Sammler vergebens mit dem *Gladiolus*, dessen Massen in nassen Jahrgängen die Haide streckenweise röthen, noch eine Menge anderer Haidepflanzen, die er sonst in Centurien eingelegt.

Aehnliche Haiden, aber im viel kleineren Massstabe, befinden sich noch bei Perlach und Sendling,

werden aber, da sie minderes botanisches Interesse darbieten, seltener von einem Botaniker besucht.

Die Moore nehmen beinahe ein Viertel des Territorium ein. Wir haben das Dachauer-, Erdinger- und Deiningermoor; die ersten beiden sind Wiesenmoore, das letztere ist ein Hochmoor oder Filz.

Das Dachauermoos fällt fast ganz in unser Gebiet, in dessen westlichen und nordwestlichen Theil es sich ausbreitet. Es erstreckt sich von Unterpfaffenhofen bis Gunzenhausen, beginnt schon eine Stunde ausserhalb der Stadt bei Moosach und reicht bis an die Hügel der Amper. Die Würm, die Moosach und noch viele andere kleinere Bäche durchfliessen dasselbe; ausserdem ist es von Kanälen, Gräben und Strassen vielfach durchschnitten. Der äussern Gestalt nach bietet es verschiedene Ansichten dar; an den Rändern drängt sich die Kultur ein, die da schon Aecker und Wiesen gebildet hat, welche aber weiter hinein allmählig versumpfen, bis sie in das Moor selbst übergehen. An andern grossen Stellen ragen nur einzelne Carexbuschen aus dem tiefen flüssigen Alme hervor; bis in weite Ferne dehnen sich dann wieder saure nasse Wiesen aus, auf welchen wol auch Birken-, Erlenbüsche nebst verkrüppelten Föhren emporwachsen; oder es erhebt sich auf einer

Lehminsel ein grosser Föhrenwald, wie z. B. das Schwarzhölzl zwischen Schleissheim und Dachau, der dann die Vegetation eines Hochmoores birgt: hier blüht unter zahlreichen Sphagnumpolstern das niedliche *Vaccinium Oxycoccus* mit der *Calluna vulgaris*. Einige, besonders die nördlichen Theile dieses Moores, versorgen mit ihrem Torf Stadt und Land. — In heissen Sommern trocknet ein grosser Theil desselben aus *).

Aehnliche Verhältnisse hat das Erdinger-moor, von dem jedoch nur der allerkleinste Theil in unsern Kreis fällt.

Von weit grösserer Wichtigkeit ist hingegen der Deiningerfilz — die Perle in der Flora von München. Von waldbedeckten Abhängen rings umgeben liegt es in einem Thalkessel an der äussersten südlichen Grenze unseres Gebietes, nur eine Stunde vom rechten Isarufer entfernt, 1935' über dem Meere. Hier treten viele nordische Pflanzen, nachdem sie den ganzen übrigen Theil Deutschlands übersprungen, zum erstenmale wieder auf. So steht an den Gräben und Torfstichen des westlichen

*) In einer solchen ganz ausgetrockneten Pfütze zwischen Moosach und Feldmoching fand ich im verflossenen Sommer grosse Stücke lehmfarbiger Erde, die sich rein aus einem *Odontidium* bestehend erwiesen.

Theiles die *Salix myrtilloides*, die *Alsine stricta*, die *Carex chordorrhiza* etc. Die sphagnumreiche Wölbung der Mitte des Moores, in der die *Carex Heleonastes*, neben den „Latschen“ (*Pinus Pumilio*) wächst, verliert sich gegen Osten allmählig in einen Schilfwald, der zuletzt in einen kleinen See übergeht, dessen Gestade von *Carex capitata* umgürtet wird. Sein Ausfluss läuft durch eine tiefe Thalschlucht, die sich bis Deisenhofen erstreckt.

Kleinere Moore befinden sich noch bei Starnberg und Potzham.

Die Wälder werden nahezu drei Achttheile des Gebietes einnehmen. So haben wir in den ausgedehnten Parken von Grünwald und Forstenried, dann in den Wäldern bei Planegg, Starnberg, Aubing, auf der nördlichen Hügelreihe, den um Schleissheim, Egelfing, Perlach und denen in der Gegend von Höhenkirchen Nadelhölzer. Diese bestehen aus Fichten und Föhren; Tannen fehlen in der näheren Umgebung von München; erst auf der nördlichen Hügelreihe, wo die Lehmschicht stärker wird, treten sie, wie schon bemerkt, in einzelnen Beständen auf.

Eichenwälder sind bei Aschheim, Allach, Planegg und Schleissheim.

Bemerkenswerth sind die Laubwälder oder Lohe bei Menzing und Eching. Sie stehen auf

Lehmmulden und zwar letzteres, das Echingerlohe, auf einer solchen in der Garchingerhaide. Eine grosse Anzahl der Pflanzen, welche in den Buchenwäldern des Isarthales vorkommen, finden auch hier wieder die geeigneten Vegetationsverhältnisse.

Von sehr untergeordnetem botanischen Werth ist der englische Garten bei München.

Alle übrigen Theile unseres Gebietes sind A e c k e r , F e l d e r und W i e s e n. Diese breiten sich besonders gegen Norden, Osten und Süd-Westen aus; sie haben zumeist auf kiesigen Unterund eine mässige Humusschichte. — Grössere Lehmlager sind nur bei Perlach, Ramersdorf, Bogenhausen, Solln, Lohhausen und, wie erwähnt, auf der nördlichen Hügelreihe.

Was nun die Aufzählung der Pflanzen selbst betrifft, so ist sie nach dem De C a n d o l l'schen System geordnet. So lange es möglich war, habe ich mich strenge nach „Koch's Flora von Deutschland“ gehalten.

Nur die Pflanzen sind aufgenommen, deren Vorkommen sicher ist; überdiess habe ich bei allen, für deren Standorte ich durch autoptische Ueberzeugung bürgen kann, ein † beigefügt. In der Bezeichnung der Dichtigkeitsskala, der Verbreitungsweise und des Vorkommens bin ich Herrn Professor

S e n d t n e r in seinen „Vegetationsverhältnissen“
gefolgt. Es bedeutet :

β^5 = Gemein,

β^4 = Verbreitet,

β^3 = Zerstreut,

β^2 = Selten,

β = Isolirt;

α^5 = in Unzahl,

α^4 = in Menge,

α^3 = in Gesellschaft,

α^2 = in Spärlichkeit,

α = in Einzelinheit.

Wo ich die Namen der ersten Finder der Stand-
orte wusste, habe ich sie beigefügt; demnach bedeutet:

B.: Brügger,

E.: Eisenbarth,

H.: Holler,

K.: Kranz,

M.: Molendo,

P.: Progel,

S.: Sendtner.

Endlich spreche ich hiemit meinem edlen Lehrer,
Herrn Geheimrath Dr. von Martius, meinen
lieben Freunden, den Herren Dr. Progel und
Dr. Holler, sowie dem Herrn Hofgartenkontroleur
G. Eisenbarth für ihre freundschaftlichst zuvor-
kommenden Mittheilungen öffentlich meinen tiefsten
Dank aus.

M ü n c h e n im Januar 1859.

Der Verfasser.

gefolgt. Es bedeutet: „Vegetationsverhältnisse“

x_1 = in Einzelheit
 x_2 = in Paarlichkeit
 x_3 = in Gesellschaft
 x_4 = in Menge
 x_5 = in Unzahl

Wo ich die Namen der ersten Kinder der Stand-
orte wußte, habe ich sie beigefügt; demnach bedeutet:

B.: Brügger
 E.: Eisenbarth
 H.: Holler
 K.: Kraus
 M.: Molander
 P.: Progel
 S.: Sandner

Endlich spreche ich hiermit meinem edlen Lehrer,
 Herrn Geheimrath Dr. von Maltus, meinen
 lieben Freunden, den Herren Dr. Progel und
 Dr. Holler, sowie dem Herrn Hofgartenkontrollen-
 r. Eisenbarth für ihre freundschafterliche Vor-
 kommenden Mittheilungen öffentlich meinen tiefsten
 Dank aus.

München im Januar 1859.

Der Verfasser.

I. Classe:

Dicotyledoneae.

I. Unterklasse: Thalamiflorae.

I. Ordnung: *Ranunculaceae* Juss.

1. **Clematis Vitalba** L. In Auen, Hecken und an Waldrändern. $\beta^3 \times^3 \dagger$. 6

— *recta* L. Im Hofgarten zu Schleissheim und ausserhalb desselben; verwildert: E. $\beta \times^2 \dagger$.

2. **Thalictrum aquilegifolium** L. Auen und Hecken. $\beta^3 \times^3 \dagger$. 5

β . *atropurpureum* Koch. Mit der Stammform.

3. — *galioides* Nestler. Auf der Garchingerhaide bis Milbertshofen, besonders auf Neubrüchen; Lochhausen; im Perlacher Wald: K. $\beta^3 \times^3 \dagger$. 7

4. — *angustifolium* Jacq. Isarauen bei den Ueberfällen: Zendtner. $\beta \times^2$. 6

5. — *flavum* L. Im Dachauermoos: E., Olching: P.; in den Amperauen bei Ampermoching: E. $\beta^3 \times^3 \dagger$. 4

6. **Anemone Hepatica** L. Laubwälder. $\beta^4 \times^4 \dagger$.

— *vernalis* L. Nantwein bei Wolfratshausen im lichten Kieferwald. $\beta \times^3 \dagger$.

7. **Anemone Pulsatilla** L. Garchingerhaide; Ismaning und Starnberg auf trockenen Wiesen: P. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$. 4
8. — *patens* L. Garchingerhaide bis Milbertshofen; bei Moosach auf Ackerrainen, den Resten der ehemaligen Haide: P. $\beta^2 \alpha^5 \dagger$.
9. — *nemorosa* L. In Laubwäldern, Auen und Hecken. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
10. — *ranunculoides* L. Wie vorige. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 4
11. **Adonis aestivalis** L. Auf Aeckern und Haiden zwischen Freimann und Fröttmaning. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$. 5
12. — *vernalis* L. Garchingerhaide. $\beta \alpha^3 \dagger$. 4
13. **Myosurus minimus** L. Theresienwiese. $\beta \alpha^2 \dagger$. 5
14. **Ranunculus paucistamineus** Tausch. Isarauen, Altwasser, Bäche. Forma terrestris: Dachauer-moos: P., K. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
15. — *divaricatus* Schrank. Wie voriger. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
16. — *fluitans* Lamb. Wie voriger. In der Amper bei Unterbruck eine sehr kurzblättrige Form: E. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
17. — *Flammula* L. Moore, Pfützen. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$. 6-7
18. — *Lingua* L. Dachauermoos. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$. 7-9
19. — *Ficaria* L. In Laubwäldern und Hecken wie: Englischer Garten, Maria-Einsiedl, Schleissheim. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
20. — *auricomus* L. Dachauermoos: Radelkofer. $\beta \alpha^2$. 4-8
21. — *montanus* Willd. Moosach im Moore: P., Aschheim: S.; Abhänge bei Schäftlarn und Gasteig: P., Starnberg auf trockenen Wiesen: H. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$. 4-5

22. **Ranunculus acris** L. Wiesen, Auen und Moore.
 $\beta^5 \alpha^5 \dagger$. 5-6
23. — **lanuginosus** L. In den Wäldern des Isarthals
 und in den Lohen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 5-7
24. — **polyanthemus** L. Auf Wiesen, in Wäldern und
 Haiden. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$. 6-7
25. — **nemorosus** DC. Wälder und Moore. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 6-7
26. — **repens** L. Auf Aeckern, Wiesen und Mooren.
 $\beta^4 \alpha^4 \dagger$. 5-7
flore pleno bei Schleissheim: E.
27. — **bulbosus** L. Felder, trockne Wiesen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 5-7
28. — **sceleratus** L. Pfützen und Moore. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$. 5-10
29. — **arvensis** L. Auf Saatfeldern mit lehmigem Bo-
 den. Im Würm- und Ampergebiet; dann Perlach,
 Milbertshofen. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$. 5-7
30. **Caltha palustris** L. Gräben, Sümpfe. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$. 4-6
31. **Trollius europaeus** L. Nasse Wiesen und Moore.
 $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 5-7
32. **Helleborus viridis** L. Am waldigen Abhang
 bei Königswiesen. $\beta \alpha^2 \dagger$. 4
33. **Aquilegia vulgaris** L. An Hecken einer trock-
 nen Wiese bei Planegg: K.; um Schleissheim: E.
 $\beta \alpha^2 \dagger$. 7
34. — **atrata** Koch. Auen, Lohe, bewaldete Abhänge.
 $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 6-7
35. **Delphinium Consolida** L. Auf Aeckern bei
 Feldmoching und Moosach: S., Allach: H., Gar-
 ching: P., nördliche Hügelreihe: E., Ismaning: K.
 $\beta^3 \alpha^2 \dagger$. 6-9

36. **Aconitum Lycoctonum** L. Wälder des Isarthals und Menzinger Lohe. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$. 6

37. **Actaea spicata** L. Wälder. $\beta^4 \alpha^2 \dagger$. 5

II. Ordnung: *Berberideae* Vent.

38. **Berberis vulgaris** L. Auen und Wälder. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

III. Ordnung: *Nymphaeaceae* DC.

39. **Nymphaea alba** L. Starnberger See: H.; in einem Weiher am Fusse der nördlichen Hügel-Reihe: E., K. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$. 6

var. *semiaperta* Klinggräff. Dürnismaning: P., B., M.; Moore und Teiche. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 8

40. **Nuphar luteum** L. Stehende und fliessende Wasser: Hirschau, Schleissheim-Dachauer-Kanal, Starnberg. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$. 6

IV. Ordnung: *Papaveraceae* DC.

41. **Papaver Argemone** L. Aecker bei Strasslach: B., bei Starnberg: H., bei Ramersdorf: S. $\beta^2 \alpha^2$. 5

42. — **Rhoeas** L. Aecker. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$. 5
 β . *strigosum* Bönigh. mit der Stammform.

43. — **dubium** L. In Saatfeldern. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 5

44. **Chelidonium majus** L. Auf Schutt, an Mauern, Abhänge. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 5-8

V. Ordnung: *Fumariaceae* DC.

45. **Corydalis cava** Schweigg. et Kort. Isarauen von Mariaeinsiedl bis Pullach. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.

46. — **fabacea** Pers. Im Hainbuchen-Wald zwischen Bayerbrunn und Ebenhausen. $\beta \alpha^2 \dagger$.

47. **Fumaria officinalis** L. Auf Schutt, an Mauern, in Aeckern. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 5
 48. — *Vaillancii* Lois. Auf Aeckern um Schleissheim: E. $\beta \alpha^2$. 6

VI. Ordnung: *Cruciferae* Juss.

49. **Nasturtium officinale** R. Br. In Quellen, Bächen und Teichen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 5
 50. — *sylvestre* R. Br. Gräben, feuchte Wiesen, um den botanischen Garten. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 6
 51. — *palustre* DC. Moore, Bachufer und Gräben. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 6
 52. **Barbarea vulgaris** R. Br. Auen, Ufer. $\beta^4 \alpha^2 \dagger$. 5-7
 53. — *arcuata* Rchb. Hirschau: B., Isarauen, Schwimmschule: M. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.
 54. — *stricta* Andrzej. Feuchte Orte wie: Schwimmschule: B., Isarauen, Schleissheim. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$. 5-7
 55. **Turritis glabra** L. Grünwald an Wegen; Moosach und Piping: P.; nördliche Hügelreihe: E. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$. 7
 56. **Arabis alpina** L. Am Isarkies und in den Isarauen. $\beta^2 \alpha \dagger$. 5
 57. — *hirsuta* Scop. Wiesen, Haiden, Moore. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 5
 58. — *arenosa* Scop. Auf den Felsen des Wasserfalls im englischen Garten. $\beta \alpha$.
 59. — *bellidifolia* Jacq. Nur einmal in den Isarauen gefunden: K. $\beta \alpha \dagger$. 7
 60. — *pumila* Jacq. Isarkies. $\beta \alpha^2 \dagger$. 7
 61. **Cardamine impatiens** L. Abhänge bei Petersbrunn: Einsele; feuchter Wald bei der Römerschanze, Isarkies: K. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$. 5-7

62. **Cardamine sylvatica** Link. Deining; Bergwald bei Ebenhausen: P. $\beta^2 \times^2 \dagger$. 4-6
63. — *hirsuta* L. Biederstein: Engert. $\beta \times^2 \dagger$. 5-6
64. — *pratensis* L. Wiesen und Moore. $\beta^5 \times^5 \dagger$. 4-8
flore pleno: mit der Stammform.
65. — *amara* L. Feuchte Wiesen und Ufer. $\beta^4 \times^4 \dagger$. 4-5
66. **Dentaria enneaphyllos** L. Grünwald: Pirngruber; Wolfratshausen bei den Steinbrüchen: S. $\beta \times^2 \dagger$. 4
— *Hesperis matronalis* L. Wird oft verwildert gefunden, z. B. bei Thalkirchen und Schwabing.
67. **Sisymbrium officinale** Scop. Auf Schutt und an Wegen. $\beta^4 \times^3 \dagger$. 6-9
68. — *Sophia* L. Nur ein einziges Mal auf Schutt in der Theresienstrasse gegen die Thurnschule gefunden: S. $\beta \times$.
69. — *Alliaria* Scop. Schattige, humusreiche Orte bei Mariaeinsiedl und Biederstein. $\beta^2 \times^2 \dagger$.
70. — *Thalianum* Gaud. Auf Feldern bei Sendling, der nördlichen Hügelreihe; Isarkies. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
71. **Erysimum cheiranthoides** L. Auen und Aecker: Hirschau, obere Isarauen, Harlaching; im Haspelmoor: S. $\beta^2 \times^2 \dagger$. 6-10
72. **Brassica Rapa** L. α . campestris Koch. Saatfelder, Auen, Schutt. $\beta^3 \times^3 \dagger$. 4-6
73. — *Napus* L. Aecker, Wiesen und Brachen. $\beta^4 \times^3 \dagger$. 4-5
74. **Erucastrum Pollichii** Schimp. et Spenn. In Aeckern bei Schleissheim: E. $\beta \times^2$. 5-10
75. **Diplotaxis muralis** DC. Kasern- und Brienner-Strasse: P., Kiesgruben bei Schwabing: K. $\beta \times^2 \dagger$. 5

76. **Alyssum calycinum** L. Steinige Orte. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 5
77. **Draba verna** L. Auf Feldern, Haiden und Wegen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$. 5
78. **Cochlearia saxatilis** Lam. Auf Felsen der Isar-Abhänge zwischen Menterschwaige und Grünwald: H.; am Isarkies. $\beta \alpha^2 \dagger$. 6-7
 — *Cochlearia Armoracia* L. Hie und da verwildert, z. B. Dachau, Freimann, Isarauen an den Ueberfällen.
79. **Camelina sativa** Crantz. Auf Brachen um Garching und Moosach. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$. 7
 a. *hirsuta* Koch Fröttmaning: P.
 β . *glabrata* Koch. Deining: M.
80. — *dentata* Pers. Deining unter der Saat: B. $\beta \alpha^3 \dagger$.
81. **Thlaspi arvense** L. Aecker. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 5-16
82. — *perfoliatum* L. Wege, steinige Wiesen, Aecker. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$. 3-5
 — *Iberis amara* L. Um Schleissheim, Heselohe und Föhring verwildert.
83. **Biscutella laevigata** L. Auen, Haiden, steinige Abhänge. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 6
84. **Lepidium campestre** R. Br. Nur einmal bei Schwabing gefunden: E. $\beta \alpha^2$. 6-7
 — *sativum* L. In der Hirschau verwildert gefunden.
85. **Hutchinsia alpina** R. Br. Kiesbänke der Isar. $\beta \alpha^2 \dagger$. 5-8
86. **Capsella Bursa pastoris** Mönch. Felder, Gärten, Wege, Schutt. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.

87. **Aethionema saxatile** R. Br. Am Isarkies; an den Abhängen der Isar bei Grünwald. $\beta \times^3 \dagger$. 4-6
88. **Neslia paniculata** Desv. Saatfelder und Brachen. $\beta^5 \times^4 \dagger$.
89. **Bunias orientalis** L. In den Aeckern zwischen Lappen und Dürnismaning: S., H. $\beta \times \dagger$.
90. **Raphanus Raphanistrum** L. Saatfelder $\beta^4 \times^4 \dagger$.
 β . *segetale* Rchb. mit der Stammform auf Aeckern z. B. Neuhausen.

VII. Ordnung: *Cistineae* Dunal.

91. **Helianthemum vulgare** Gärtner. Haiden, trockne Wiesen, Wege. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
 α . *tomentosum* Koch. Menterschwaige: S.
 β . *hirsutum* Koch. Garchingerhaide: S.
 ϵ . *albiflorum* Koch. Mit vorigem: P.
 ζ . *leptopetalum* Koch. Mallertshofen.

VIII. Ordnung: *Violarieae* DC.

92. **Viola hirta** L. In Wäldern, Gebüsch, auf Wiesen und Haiden. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
93. — *collina* Bess. An den Isarabhängen von Maria-Einsiedl bis Schäftlarn. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
94. — *odorta* L. Hecken und Wälder $\beta^2 \times^3 \dagger$.
 β . *albiflora* bei Thalkirchen: K.
95. — *arenaria* DC. Garchingerhaide bis Milbertshofen; Isarauen bei der Menterschwaige $\beta^3 \times^3 \dagger$.
96. — *sylvestris* Lam. Wälder, Gebüsch, Moore. $\beta^4 \times^3 \dagger$.

Viola sylvestris. β . *Riviniana* Rchb. Grünwald:
S., englischer Garten: K.

97. — *canina* L. Büsche, Haiden, Moore. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 5 6

98. — *mirabilis* L. Laubwälder im Isarthal; Men-
zinger Lohe und Kapucinerhölzl: P. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$. 4

99. — *tricolor* L.

a. vulgaris Koch. Unterschleissheim auf Aeckern:
P.; Isarkies. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.

β . *arvensis* Koch. Aecker. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.

IX. Ordnung: *Resedaceae* DC.

100. **Reseda** *lutea* L. Strassengräben, trockne Wie-
sen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

101. — *luteola* L. Isarauen, besonders bei Föhring:
P.; auf Feldern bei Perlach und Ramersdorf: H.;
trockne Abhänge der nördlichen Hügelreihe. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$. 7

X. Ordnung: *Droseraceae* DC.

102. **Drosera** *rotundifolia* L. Dachauer- und Dei-
ninger-Moos. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 7

103. — *longifolia* L. Wie vorige. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 7

β . *obovata* Koch. Deininger-Moos: P.

104. **Parnassia** *palustris* L. Feuchte Wiesen und
Moore. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

XI. Ordnung: *Polygaleae* Juss.

105. **Polygala** *vulgaris* L. Haiden, Wiesen und
Moore. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$. 5

106. — *comosa* Schk. Haiden, trockene Wiesen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$. 5

107. **Polygala amara** L. Auen, feuchte Wiesen, Moore. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$. 5

δ . *austriaca* Koch. Isarkies: S.

ε . *uliginosa* Rchb. Moorwiesen. 80

108. — **Chamaebuxus** L. Haiden, trockene Wiesen, lichte Wälder; Abhänge bei der Mengerschwaige. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$. 4

XII. Ordnung: *Sileneae* DC.

109. **Gypsophila repens** L. Isarauen. $\beta \alpha^4 \dagger$. 5

110. **Tunica saxifraga** Scop. Strassengräben und trockene Wiesen bei der Thurnschule bis zur Schwimmschule; Freimann: P. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$. 4

111. **Dianthus Armeria** L. Im Forstgraben vor dem Fasangarten bei Perlach: K. $\beta \alpha \dagger$. 6

112. — **Carthusianorum** L. Trockene Wiesen, Abhänge. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$. 6-9

β . *pusillus* auf der Garchinger Haide.

113. — **Seguierii** Vill. Grünwalder Park an mehreren Stellen; Höhenkirchen: P. $\beta \alpha^2 \dagger$. 6

114. — *caesius* Sm. An den Abhängen bei der Mengerschwaige und bei Biederstein: P. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$. 5

115. — *deltoides* L. Moore um Schleissheim gegen Dachau und Eching. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$. 6

116. — *superbus* L. Moore und feuchte Wiesen wie bei Hartmannshofen, Isarauen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 7

117. **Saponaria Vaccaria** L. Früher nur in Einem Leinacker bei Garching; nun dort ziemlich weit verbreitet. $\beta \alpha^2 \dagger$. 801

118. **Saponaria officinalis** L. Isarauen bei Föhring: H., Schleissheim unter Gebüsch. $\beta \times^2 \dagger$. γ
119. **Silene gallica** L. Aecker der nördlichen Hügelreihe, Schleissheimer Hofgarten: E. $\beta \times$. γ
120. — **nutans** L. Haiden und Abhänge. $\beta^4 \times^3 \dagger$. 5
121. — **inflata** Sm. Wiesen. $\beta^5 \times^4 \dagger$. γ
122. — **noctiflora** L. Trockene Wiesen und Brachen, auf Schutt. $\beta^4 \times^3 \dagger$. γ
- **Silene Armeria** L. Hie und da verwildert wie um Schleissheim, Menterschwaige.
123. — **linicola** Gmel. Auf Leinäckern bei Moosach und Dachau: S. $\beta \times^3$.
124. **Lychnis Viscaria** L. Kapuzinerhölzl: P. $\beta \times \dagger$.
125. — **Flos cuculi** L. Feuchte Wiesen. $\beta^5 \times^3 \dagger$.
126. — **vespertina** Sibth. Saatfelder und Brachen. $\beta^5 \times^3 \dagger$.
127. — **diurna** Sibth. Wiesen. $\beta^5 \times^5 \dagger$. 5
128. **Agrostemma Githago** L. Saatfelder. $\beta^4 \times^2 \dagger$. 6

XIII. Ordnung: *Alsineae* DC.

129. **Sagina procumbens** L. Auf entblösstem Boden und Wegen wie um Schleissheim und Grünwald. $\beta^4 \times^3 \dagger$. 5
130. — **nodosa** E. Meyer. Im Dachauer Moos; am Isarkies; um Biederstein auf nassen Wiesen. $\beta^3 \times^3 \dagger$. γ
131. **Spergula arvensis** L. Auf Aeckern und Brachen. $\beta^3 \times^4 \dagger$. 6
132. **Alsine stricta** Wahlenb. Deiningermoor; Moore bei Starnberg: Einsele. $\beta \times^3 \dagger$. γ

133. *Alsine Jacquinii* Koch. Auf der Garchingerhaide bis Freimann; am Abhang bei Gasteig: Einsele.

$\beta^2 \alpha^3 \dagger$.

134. *Moehringia trinervia* Clairv. Feuchte Wälder und schattige Abhänge. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.

135. *Arenaria serpyllifolia* L. Auf Aeckern, Kies, Wegen und Mooren. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

β . *glutinosa* Koch: Dachauermoos.

γ . *tenuior* Koch: Isarkies.

136. *Holosteum umbellatum* L. Trockene Wiesen um Feldmoching; Kieswege bei Schleissheim; Aecker von der Schwimmschule bis Nymphenburg: P. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

137. *Stellaria nemorum* L. Feuchte Schluchten des oberen Isarthals. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

138. — *media* Vill. Ueberall als Unkraut. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

139. — *graminea* L. Auen, Hecken, Wälder. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.

140. — *uliginosa* Murr. Feuchte Wiesen bei Thalkirchen: B., und bei Starnberg: Einsele. $\beta \alpha^2 \dagger$.

141. *Malachium aquaticum* Fries. Gräben, Auen, Gebüsch. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

142. *Cerastium glomeratum* Thuill. Auf Neubrüchen bei Heselohe: P. $\beta \alpha^2 \dagger$.

143. — *brachypetalum* Desp. Lehmige Abhänge bei Mariaeinsiedl: S., an der nördlichen Hügelreihe: K. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.

β . *glandulosum* Koch. Zwischen Freimann und Biederstein.

144. **Cerastium semidecandrum** L. Steinige Wiesen bei Gern: P., zwischen Biederstein u. Freimann, Abhänge bei Harlaching: S. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$. ³
145. — *glutinosum* Fries. Am Kugelfang und Marsfeld auf kiesigen Stellen, auf trockenen Weiden bei Milbertshofen mit var.
 β . *obscurum* Koch. $\beta \alpha^3 \dagger$.
146. — *triviale* Link. Wiesen und Moore. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
 β . *holosteoides* Fries. Mit der Stammform. ⁵
147. — *alpinum* L. Im Moos zwischen Lohhausen und Dachau: H. $\beta \alpha^3$. ⁷
148. — *arvense* L. Felder, Strassengräben. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. ⁴

XIV. Ordnung: *Lineae* DC.

149. **Linum viscosum** L. Haide bei Freimann. $\beta \alpha^3 \dagger$. ⁶
150. — *tenuifolium* L. In Kiesgruben und in Aeckern auf der Garchingerhaide zwischen Garching und Dittersheim: S., zwischen Garching und Eching: P. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$. ⁶
151. — *perenne* L. Garchingerhaide bis Neuherberg und Freimann; bei Ismaning: P. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$. ⁶
 — *usitatissimum* L. Verwildert am Isarkies bei Föhring; P., K.
152. — *catharticum* L. Auen, Wiesen, Haiden, Moore. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. ⁶

XV. Ordnung: *Malvaceae* R. Br.

153. **Malva Alcea** L. Nördliche Hügelreihe an Hecken: E. $\beta \alpha^2 \dagger$. ⁷

154. — *sylvestris* L. An Schutthaufen in Dörfern. $\beta^4 \times^2 \dagger$. 7
 155. — *vulgaris* Fries. An ähnlichen Orten. $\beta^5 \times^3 \dagger$.

XVI. Ordnung: *Tiliaceae* Juss.

156. **Tilia** *grandifolia* Ehrh. In Wäldern bei Nymphenburg, Schleissheim, Egelfing: K. $\beta^4 \times^2 \dagger$.
 157. — *parvifolia* Ehrh. Wild im Forste bei Neufarn: K.; ausserdem oft verwildert. $\beta \times \dagger$.

XVII. Ordnung: *Hypericineae* DC.

158. **Hypericum** *perforatum* L. Wälder, Auen und Wiesen. $\beta^5 \times^4 \dagger$. 7
 159. — *humifusum* L. In Waldschlägen: bei Neuried und zwischen Deining und Dingharding: B.; Grünwalder Park: H.; auf der nördlichen Hügelreihe: E.; bei Perlach: P. $\beta^2 \times^2 \dagger$. 6
 160. — *quadrangulum* L. Haine bei Schleissheim: E. $\beta \times^2$.
 161. — *tetrapterum* Fries. Feuchte Wiesen und Ufer. $\beta^4 \times^2 \dagger$. 7
 162. — *montanum* L. Abhänge, Waldränder, Gebüsche. $\beta^3 \times^2 \dagger$. 6
 163. *hirsutum* L. Isarauen; Milbertshofen: P.; nördliche Hügelreihe: E. $\beta^2 \times^2 \dagger$. 7

XVIII. Ordnung: *Acerineae* DC.

164. **Acer** *Pseudoplatanus* L. Auen und Laubwälder wie im Menzingerlohe: P. $\beta^3 \times^2 \dagger$. 5
 165. — *plantanoides* L. In den Isarleiten von Gross-Heselohe nach Ebenhausen: S. $\beta \times^2 \dagger$. 4
 166. — *campestre* L. Gebüsch und Wälder, z. B. Grossheselohe und Schleissheim. $\beta^4 \times^2 \dagger$. 5

XIX. Ordnung: *Ampelideae* Kunth.

Ampeliopsis hederacea Mich. In der Hirschau verwildert: P., K.

XX. Ordnung: *Geraniaceae* DC.

167. ***Geranium sylvaticum*** L. Waldige Abhänge bei Heselohe und Ebenhausen: S.; Allach im Lohe. $\beta^2 \kappa^2 \dagger$. 6
168. — *palustre* L. Auf feuchten Wiesen und Mooren, besonders unter Gebüsch: Dachauermoos, Deining, Ebenhausen. $\beta^3 \kappa^3 \dagger$. 6
169. — *sanguineum* L. Abhänge der Isar bei Harlaching und Pullach; unter Gebüsch bei Hartmannshofen und bei Garching: P. $\beta^3 \kappa^3 \dagger$. 6
170. — *pyrenaicum* L. Strassengräben bei Bogenhausen: P. $\beta \kappa \dagger$.
171. — *pusillum* L. Schutt, Wege, Aecker. $\beta^5 \kappa^3 \dagger$. 5
172. — *dissectum* L. Aecker, Hecken. $\beta^4 \kappa^2 \dagger$. 5
173. — *columbinum* L. Aecker, Gebüsch. $\beta^3 \kappa^3 \dagger$. 5
174. — *molle* L. Wege, Aecker. $\beta^5 \kappa^3 \dagger$. 5
175. — *robertianum* L. Auf Schutt an Mauern und in Wäldern. $\beta^5 \kappa^4 \dagger$. 4
176. ***Erodium cicutarium*** L' Herit. Auf Feldern, Wegrändern und Brachen. $\beta^5 \kappa^4 \dagger$. 5

XXI. Ordnung: *Balsamineae* A. Rich.

177. ***Impatiens Noli tangere*** L. Haine, schattiges Gebüsch, z. B. im englischen Garten, Harlaching und Heselohe. $\beta^3 \kappa^4 \dagger$. 7

XXII. Ordnung: *Oxalideae* DC.

178. **Oxalis** *Acetosella* L. Wälder und Haine. $\beta^4 \alpha^3 \dagger.4$

XXIII. Ordnung: *Rutaceae* Juss.

Ruta graveolens L. In Dörfern verwildert, z. B. in Aschheim.

II. Unterklasse: **Calcyflorae.**XXIV. Ordnung: *Celastrineae* R. Br.

179. **Evonymus** *europaeus* L. Wälder, Hecken und Auen. $\beta^5 \alpha^3 \dagger.5$

XXV. Ordnung: *Rhamnaceae* R. Br.

180. **Rhamnus** *cathartica* L. Wälder, Hecken und Auen. $\beta^5 \alpha^3 \dagger.5$

181. — *saxatilis* L. Garchingerhaide bis Schleissheim, Ismaning und Freimann; bei der Menterschwaige. $\beta^2 \alpha^2 \dagger.5$

182. — *frangula* L. Auen, Wälder und Moore. $\beta^5 \alpha^3 \dagger.$

XXVI. Ordnung: *Papilionaceae* L.

Sarothamnus vulgaris Wimm. Bei Unterbruck; S.

183. **Genista** *tinctoria* L. Haiden, Wälder und Wiesen. $\beta^5 \alpha^3 \dagger.$

184. — *germanica* L. Haine und Wälder. $\beta^3 \alpha^3 \dagger.$

185. **Cytisus** *nigricans* L. Abhänge der Isar, Isar-Auen; im Haine bei Hartmannshofen: P. $\beta^2 \alpha^4 \dagger.$

186. — *atisbonensis* Schaffer. Auf Haiden, trockenen Wiesen, in lichten Wäldern und Auen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger.6$

187. **Ononis** *spinosa* L. Auen, Haiden, Wege. $\beta^5 \alpha^3 \dagger.$

188. **Ononis repens** L. An ähnlichen Orten. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 6
189. **Anthyllis Vulneraria** L. Auf Auen, Wiesen und Haiden. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
γ. rubriflora Koch. Biederstein: P.
190. **Medicago sativa** L. Wiesen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 5
191. — *falcata* L. Wiesen, Raine. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 5
192. — *falcata-sativa* Wimm. Wiesen um Schleissheim: E. $\beta \alpha^3 \dagger$.
193. — *lupulina* L. Auen, Wiesen, Aecker, Kiesbänke. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$. 4
194. **Melilotus macrorrhiza** Pers. Auen, Wiesen, Ufer. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
195. — *alba* Desrousseaux. Aecker, Auen, Wege. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
196. — *officinalis* Desrousseaux. An ähnlichen Orten. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.
 — *coerulea* Lam. Verwildert hie und da, wie in Schleissheim, Dachau und Biederstein.
197. **Trifolium pratense** L. Wiesen. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$. 5
198. — *medium* L. Wälder, Auen und Triften. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
199. — *alpestre* L. Haiden, Wälder wie Grünwald, Kapuzinerhölzl. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 3
200. — *rubens* L. Garchingerhaide, bei Geiseltasteig; ferner im Kapuzinerhölzl: S., im Wald bei Egelting: K. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 5
201. — *ochroleucum* L. Auf einem Brachfeld bei Hadorf: Einsele. $\beta \alpha^3$. 6
202. — *arvense* L. Trockene Wiesen, Brachen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 5
203. — *fragiferum* L. Auen und Triften: Föhring, Thalkirchen; Dürnismaning, Lohhausen: P. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 5

204. **Trifolium montanum** L. Auen, Wiesen, Haiden, Moore. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 5
205. — *repens* L. Auen, Aecker, Wege. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$. 5
206. — *hybridum* L. Auf feuchten Wiesen: Schleissheim, Biederstein, Thalkirchen. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$. 5
207. — *agrarium* L. Waldränder bei Grünwald: S., im Kapuzinerhölzl: P., der nördlichen Hügelreihe: K.; Aecker bei Berg am Laim: P. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 6
208. — *procumbens* L. Auen, trockene Wiesen und Brachen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$. 5
209. — *filiforme* L. Feuchte Wiesen und Aecker. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
210. **Dorycnium suffruticosum** Vill. In den Isar-Auen und auf der Garchingerhaide. $\beta^2 \alpha^5 \dagger$. 5
211. **Lotus corniculatus** L. Auen, Wiesen und Triften. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$. 5
- β . *ciliatus* Koch. Sonnige Haiden z. B. Garching: S.
- γ . *hirsutus* Koch. Garching; Eisenbahndamm bei Pasing: S.
212. — *uliginosus* Schk. Feuchte Wiesen bei Thalkirchen: S. $\beta \alpha^2$. 5
213. **Tetragonolobus siliquosus** Roth. Auen, Wiesen und Triften. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 5
214. **Galega officinalis** L. Mehrmals im Dachauer-Moose zwischen Moosach und Feldmoching gefunden: K. $\beta \alpha^2 \dagger$. 5
215. **Astragalus Cicer** L. Auf Ackerrainen und Triften: Maisach, Feldmoching, Fröttmaning; bei der Brudermühle: S.; Georgenschwaige. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$. 5

216. **Astragalus glycyphyllos** L. Auen, Gebüsch, Eisenbahndämme. $\beta^4 \alpha^2 \dagger$.
217. **Coronilla vaginalis** Lam. Auf der Garchinger-Haide; in den Isarauen; Abhänge bei der Menter-schwaige. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 5
218. — *varia* L. Strassengräben, Felder, Raine. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 6
219. **Hippocrepis comosa** L. Auen, Wiesen, Hai-den. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$. 5
220. **Onobrychis sativa** L. Wiesen. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
221. **Vicia dumetorum** L. Hecken, Schläge und Wald-ränder bei Mariaeinsiedl und Ebenhausen: S.; Bayerbrunn: P.; nördliche Hügelreihe: E. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$. 7
222. — *Cracca* L. Saatfelder und Hecken. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$. 5
223. — *villosa* Roth. β . *glabrescens* Koch. In Saat-feldern bei: Laim, Ramersdorf, Thalkirchen, Ebenhausen: S.; Deining, Starnberg, Milberts-hofen und Schleissheim. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
224. — *sepium* L. In Hecken, Auen und Wäldern. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
225. — *sativa* L. Auf Saatfeldern und Brachen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
226. — *angustifolia* Roth. Saatfelder um Moosach, Schleissheim und Starnberg. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.
 α . *segetalis* Koch. Grünwald.
 β . *Bobartii* Koch. Schleissheim, Grünwald.
227. **Ervum hirsutum** L. In Saatfeldern. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$. 5
228. — *tetraspermum* L. In Aeckern. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.
 — *Pisum arvense* L. In den Isarauen oft verwildert ge-funden.

229. **Lathyrus tuberosus** L. Auf Saatfeldern bei Feldmoching: P. $\beta \times^2 \dagger$.
230. — *pratensis* L. Auen, Wiesen und Ufer. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
231. — *sylvestris* L. Nördliche Hügelreihe, besonders bei Heimhausen: S.; am Eisenbahndamm bei Lohhausen: H. $\beta \times^2 \dagger$.
232. **Orobis vernus** L. In Laubwäldern bei Blutenburg: v. Spitzl; Allach, Pasing, Starnberg: P. $\beta^2 \times^2 \dagger$.
233. — *niger* L. Föhring: M. $\beta \times$.

XXVII. Ordnung: *Amygdaleae* Juss.

234. **Prunus spinosa** L. Hecken und Waldsäume. $\beta^5 \times^3 \dagger$.
 β . *coaetanea* W. et G. Englischer Garten und Menterschwaige.
235. — *avium* L. Auen und Wälder. $\beta^4 \times^2 \dagger$.
236. — *Padus* L. Auen und Hecken. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
 — *Mahaleb* L. In den Isarauen cult. und verwildert.

XXVIII. Ordnung: *Rosaceae* Juss.

237. **Spiraea Aruncus** L. In den Wäldern des obern Isarthals. $\beta^2 \times^3 \dagger$.
238. — *Ulmaria* L. Auf feuchten Wiesen und Mooren im Gebüsch, an Ufern und Gräben. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
 α . *denudata* Koch. Schleissheim, Moosach.
 β . *discolor* Koch. Häufiger.
239. — *Filipendula* L. Auen, Wiesen u. Haiden. $\beta^4 \times^3 \dagger$.

240. **Dryas octopetala** L. Isarauen. $\beta \times^3 \dagger$.
241. **Geum urbanum** L. Auen, Waldränder, Triften.
 $\beta^3 \times^3 \dagger$.
242. — *rivale* L. Ufer, Moore, feuchte Wiesen. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
\beta. pallens Brügger. Bei Kothgeisering: B.;
bei Deining: K.
243. — *urbano-rivulare*. Kothgeisering: B.
244. **Rubus saxatilis** L.*) Wälder, Echinger- und
Menzinger-Lohe, Heselohe und Perlach. $\beta^3 \times^4 \dagger$. 5
245. — *Idaeus* L. Isarauen, im Walde zu Perlach
und auf der nördlichen Hügelreihe. $\beta^2 \times^5 \dagger$.
246. — *suberectus* Anders. sec. Sendtner. In feuchten
Wäldern der nördlichen Hügelreihe bei Heim-
hausen: P., E., K. $\beta \times^2$. 6
247. — *fruticosus* L. Nördliche Hügelreihe: P. $\beta \times^2 \dagger$. 6
248. — *glandulosus* Bell. In den Wäldern um Schleiss-
heim (?). $\beta \times^3 \dagger$. 4
249. — *Radula Weihe* sec. Sendtner. An den Ab-
hängen der Isar; in den Wäldern um Schleiss-
heim und Starnberg. $\beta^3 \times^3 \dagger$. 6
250. — *tomentosus* Borkh. Maisteig an der nördlichen
Hügelreihe: P., E., K. $\beta \times$. 6
251. — *vulgaris Weihe* sec. Sendtner.
\beta. discolor Weihe. Isarabhänge, nördl. Hügel-
reihe, Schleissheim, Starnberg. $\beta^3 \times^3 \dagger$. 7

*) Anm. Vid. Reg. Flora Nro. 13, 1856 u. Reg. Flora Nr. 30,
1857. Beitrag zur Kenntniss der Brombeersträucher Südbayerns
von L. Molendo.

252. **Rubus nemorosus** Hayne. Isarabhänge bei der Mengerschwaige: M., P. $\beta \times^2 \dagger$.
253. — **caesius** L. An Hecken, in Aeckern und Gebüsch. $\beta^5 \times^4 \dagger$.
254. **Fragaria vesca** L. Wälder. $\beta^5 \times^5 \dagger$. ⁵
255. — **elatio**r Ehrh. Auen und Hecken. $\beta^4 \times^4 \dagger$. ⁵
256. — **collina** Ehrh. Haiden bei Schleissheim, Garching, Moosach. $\beta^3 \times^3 \dagger$. ⁵
257. **Comarum palustre** L. Deininger- und Dachauermoos. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
258. **Potentilla supina** L. Auf dem Kies des Weges, der von Eching nach Gunzenhausen führt: E., K. $\beta \times^3 \dagger$.
259. — **rupestris** L. Im Kapuzinerhölzl: Steinheil; um Neuherberg: P.; trockene Wiesen bei Freimann: B. $\beta^2 \times$.
260. — **anserina** L. Wege, Aecker und Triften. $\beta^5 \times^4 \dagger$.
261. — **recta** L. Biederstein: Radelkofer. $\beta \times \dagger$.
262. — **inclinata** Vill. Auf Feldrainen bei Moosach: S., und bei Unterschleissheim: E.; bei Eching: P.; Föhring und Zamdorf: M. $\beta^2 \times^2 \dagger$.
263. — **argentea** L. Auf Rainen und Brachen wie um Berg am Laim und Moosach: S., Schleissheim, Haching. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
264. — **reptans** L. Wege, Triften und Gräben. $\beta^5 \times^4 \dagger$.
265. — **Tormentilla** Schrank. Haiden, Wälder und Moore. $\beta^5 \times^4 \dagger$.
266. — **verna** L. Haiden, Triften und Abhänge. $\beta^5 \times^3 \dagger$.

267. **Potentilla cinerea** Chaix. Haiden bei Garching, Milbertshofen und Freimann mit var.
 β . *trifoliata* Koch. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
268. — *opaca* L. Auen, Haiden und Raine. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
269. — *alba* L. Wälder und Triften wie bei Nymphenburg, Grünwald, Garching, Perlach; im Dachauermos bei Moosach: H. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
270. — *Fragariastrum* Ehrh. Grünwald am Rande des Parks: S.; am Waldrand zwischen Planegg und Gauting: H. $\beta^2 \times^3 \dagger$.
271. **Agrimonia Eupatoria** L. Trockene Wiesen, Triften und Wälder. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
272. — *odorata* Ait. Waldränder und Hecken. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
273. **Rosa alpina** L. Im Isarthal bei Grünwald, Pullach; bei Deining und Starnberg. $\beta^2 \times^2 \dagger$.
274. — *cinnamomea* L. Isarauen; an Waldrändern bei Unterschleissheim: E. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
275. — *canina* L. Hecken, Auen und Wälder. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
 α . *collina* Koch. Nördliche Hügelreihe: K., Grünwald, Perlach: P.
 β . *dumetorum* Koch. Moosach: P.
276. — *rubiginosa* L. Gebüsch, Wälder bei Grünwald, auf der nördlichen Hügelreihe. $\beta^2 \times^2 \dagger$.
277. — *tomentosa* Sm. Hecken und Wälder, z. B. Freimann, Grünwald, Planegg, Starnberg, Schleissheim. $\beta^4 \times^2 \dagger$.
278. — *arvensis* Huds. Auen und Wälder, z. B. Heseloh, Starnberg. $\beta^3 \times^3 \dagger$.

XXIX. Ordnung: *Sanguisorbeae* Lindl.

279. **Alchemilla vulgaris** L. Wiesen, Haiden, Wälder. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

β . *subsericea* Koch. In Wäldern.

280. — *arvensis* Scop. Felder und Brachen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.

281. **Sanguisorba officinalis** L. Wiesen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

282. **Poterium Sanguisorba** L. Wiesen, Triften und Auen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

XXX. Ordnung: *Pomaceae* Lindl.

283. **Crataegus Oxyacantha** L. Hecken und Waldränder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

284. — *monogyna* Jacq. Hecken, Auen und Waldränder. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.

285. **Cotoneaster tomentosa** Lindl. Isarabhänge bei Grünwald und Heselohe. $\beta \alpha^2 \dagger$.

286. **Pyrus communis** L. Wälder und Hecken z. B. Hirschau $\beta^2 \alpha \dagger$.

287. — *Malus* L. An ähnlichen Standorten. $\beta^2 \alpha \dagger$.

288. **Aronia rotundifolia** Pers. An den Abhängen der Isar; am Isarkies bei Wolfratshausen: H. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.

289. **Sorbus Aucuparia** L. Abhänge der Isar und der nördlichen Hügelreihe. $\beta^2 \alpha \dagger$.

290. — *Aria* Crantz. Isarabhänge. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.

291. — *torminalis* Crantz. Zwischen Bayerbrunn und Ebenhausen gegen den Rand des Abhanges: S. $\beta \alpha$.

XXXI. Ordnung: *Onograriae* Juss.

292. **Epilobium angustifolium** L. Auen, Ufer, Waldschläge. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
293. — *hirsutum* L. Ufer, sumpfige Orte. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
294. — *parviflorum* Schreb. Gräben, sumpfige Orte, Ufer. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
295. — *montanum* L. Feuchte Wälder, Quellen, Gebüsch, Moore. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
 β . *lanceolatum* Koch. Abhänge der Isar;
 γ . *collinum* Gmel. Trockene, steinige Plätze.
296. — *palustre* L. Deininger u. Dachauer Moor. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
297. — *tetragonum* L. In der Kiesgrube bei Schwabing: P.; Isarauen bei den Ueberfällen: K. $\beta \alpha \dagger$.
298. — *roseum* Schreb. Feuchte Plätze. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
299. **Oenothera biennis** L. Trockene Wiesen, Abhänge, Ufer. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.
300. — *muricata* L. An der Gartenplanke der Brudermühle: S. $\beta \alpha \dagger$.
301. **Circaea lutetiana** L. Schattige Haine z. B. Mariaeinsiedl, Heselohe. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
302. — *alpina* L. Mühlthal bei Grünwald; Grünwalder Park: P., bei Schäftlarn: H. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.

XXXII. Ordnung: *Halorageae* R. Br.

303. **Myriophyllum verticillatum** L. In Altwassern, Canälen, und Gräben. $\beta^4 \alpha^5 \dagger$.
 β . *pectinatum* Koch. Gräben im Dachauer-Moor: S.
304. — *spicatum* L. Wie voriges. $\beta^4 \alpha^5$.

XXXIII. Ordnung: *Hippurideae* Link.

305. **Hippuris vulgaris** L. In Gräben bei Biederstein: P.; Rothe Schwaig bei Dachau: K., in den Isarauen: H. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.

XXXIV. Ordnung: *Callitrichineae* Link.

306. **Callitriche cophocarpa** Sendt. In stehenden und fließenden Wässern: Hirschau, Starnberg; Dachauermoos. $\beta^3 \alpha^5 \dagger$.

XXXV. Ordnung: *Ceratophylleae* Gray.

307. **Ceratophyllum demersum** L. In Canälen bei Schleissheim und Nymphenburg. $\beta^2 \alpha^5$.

XXXVI. Ordnung: *Lythrarieae* Juss.

308. **Lythrum Salicaria** L. Auf feuchten Wiesen, Mooren und an Ufern. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

XXXVII. Ordnung: *Tamariscineae* Desv.

309. **Myricaria germanica** Desv. Isarauen. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.

XXXVIII. Ordnung: *Portulacaceae* Juss.

— *Montia minor* Gmel. Wird von Zuccarini in Deininger und Schleissheimer Moor angegeben.

XXXIX. Ordnung: *Paronychieae* St. Hil.

310. **Herniaria glabra** L. Auf Kies bei der Turnschule, auf den Wegen um die Bavaria, und um Schleissheim; im Dachauer Moor an ausgetrockneten Stellen: E., K. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

XL. Ordnung: *Scleranthae* Link.

311. **Scleranthus annuus** L. Kiesgruben und Saatefelder. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

XLI. Ordnung: *Crassulaceae* DC.

312. **Sedum maximum** Suter. Steinige Aecker und Raine. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
313. — *purpurascens* Koch. Auf Aeckern um den Judenkirchhof: S., um Wärnbrunn bei Grünwald: Pirngruber; Carolinenfeld: P. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
314. — *villosum* L. Haspel- u. Deininger Moor. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
315. — *acre* L. Trockene Abhänge und Aecker. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
316. — *sexangulare* L. In ähnlichen Orten wie voriges. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
- *Sempervivum tectorum* L. In Höhenkirchen auf den Dächern der Bauernhäuser und auf den Mauern des Dachauer Schlosses: K.

XLII. Ordnung: *Grossularieae* DC.

317. **Ribes Grossularia** L. β . pubescens Koch. Isarauen, Perlacher Forst. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.
318. — *rubrum* L. Isarauen, Perlacher Forst. $\beta \alpha^2 \dagger$.

XLIII. Ordnung: *Saxifrageae* Vent.

319. **Saxifraga mutata** L. Abhänge der Isar bei der Menterschwaige. $\beta \alpha^4 \dagger$.
320. — *Hirculus* L. Deininger Filz. $\beta \alpha^5 \dagger$.
321. — *tridactylites* L. Magere Aecker und Haiden. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
322. — *granulata* L. Wiesen, Hügel. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.

323. **Chrysosplenium alternifolium** L. Feuchte Wälder und Auen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$. 3

XLIV. Ordnung: *Umbelliferae* Juss.

324. **Sanicula europaea** L. In Laubwäldern. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
325. **Astrantia major** L. Abhänge bei Mariaeinsiedl; Lohe, Starnberg. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 6
326. **Cicuta virosa** L. An Ufern und in Sümpfen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
 β . *tenuifolia* Koch. Deiningermoos: B.; Haspelmoor: S.
327. **Helosciadium repens** Koch. Dachauer-, Deiningen- und Haspelmoor; Auen bei Freimann. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 7
328. **Falcaria Rivini** Host. Bei der Brudermühle und ober Pullach: S.; grasige Abhänge der nördlichen Hügelreihe bei Innhausen: E. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
329. **Aegopodium Podagraria** L. Gärten, Auen und Hecken. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
330. **Carum Carvi** L. Wiesen und Wegränder. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
331. **Pimpinella magna** L. Wiesen, Auen und Moore. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$. 6
 γ . *laciniata* Wallr. Isarauen: S.
 δ . *dissecta* Koch. Schleissheim: E., K.
332. — **Saxifraga** L. Wiesen, Haiden, Abhänge. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
333. **Berula angustifolia** Koch. Gräben und Moore. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.

334. **Bupleurum longifolium** L. In Laubwäldern bei Mariaeinsiedl; im Menzinger Lohe: P.; zwischen Gauting und Planegg: Kurz. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
335. — **rotundifolium** L. Aecker um Schleissheim: P. $\beta. \alpha.$
336. **Aethusa Cynapium** L. Auf Feldern, Schutt in Dörfern. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 $\beta. agrestis$ Wahlroth. Auf Aeckern um Schleissheim und Milbertshofen.
337. **Seseli coloratum** Ehrh. Garchingerhaide; trockene Wiesen bei der Menterschwaige und Haching. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.
338. **Silaus pratensis** Bess. In Auen und auf Wiesen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
339. **Selinum carvifolia** L. Auen, Waldwiesen und Moore. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
340. **Libanotis montana** All. Abhänge bei Grünwald und Pullach: M.; Garchingerhaide: S. $\beta \alpha^2 \dagger$.
341. **Angelica sylvestris** L. Ufer, feuchte Triften und Abhänge. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
 $\beta. montana$ (A. montana Schleich.) Grünwald, Deining: P., M.; Starnberg: K.
342. **Peucedanum Cervaria** Lap. Triften bei Grünwald, im Kapuzinerhölzl und im Moore bei Moosach. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
343. — **Oreoselinum** Mönch. Garchingerhaide; Abhänge bei Heselohe und der Menterschwaige; Menzing und Nymphenburg auf trockenen Waldwiesen: P. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

344. **Thysselinum palustre Hoffm.** Moore und Ufer. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
345. **Pastinaca sativa L.** Wiesen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
346. **Heracleum Sphondylium L.** Wiesen. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
347. **Laserpitium latifolium L.** Im Isarthal und auf der Garchingerhaide: E., K. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
348. — *prutenicum L.* Kapuzinerhölzl: S.; Dachauermoos; nördliche Hügelreihe: P. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.
349. **Daucus Carota L.** Wiesen, Aecker und Brachen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
350. **Caucalis daucoides L.** Auf einem Acker der Garchinger Haide gegen Eching: M., E., K. $\beta \alpha \dagger$.
351. **Torilis Anthriscus Gmel.** Hecken, Gebüsche, Auen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
352. **Anthriscus sylvestris Hoff.** Wiesen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
— *Cereseolum Hoff.* Am Zaune ober Geiseltasteig verwildert: S.
353. **Chaerophyllum temulum L.** In Hecken, auf Schutthaufen und an Waldsäumen z. B. bei der Mengerschwaige und bei Schwabing. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
354. — *bulbosum L.* In Hecken bei Hartmannshofen: S. $\beta \alpha^2 \dagger$.
355. — *aureum L.* In Auen, Waldsäumen, Gebüsch. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
356. — *hirsutum L.* Waldige Abhänge z. B. Grünwald, Pullach, nördliche Hügelreihe. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
357. **Conium maculatum L.** In Dörfern z. B. Starnberg, Haching. $\beta^3 \alpha^2$.

- 358. *Pleurospermum austriacum* Hoffm.** Isarauen bei Harlaching: S. β α $\dagger$.
— *Coriandrum sativum* L. Oft verwildert z. B. Föhring, Neuhausen.

XLV. Ordnung: *Araliaceae* Juss.

- 359. *Hedera Helix* L.** An Baumstämmen in Wäldern.
 β^5 α^4 $\dagger$.

XLVI. Ordnung: *Corneae* DC.

- 360. *Cornus sanguinea* L.** In Gebüsch und Wäldern. β^4 α^3 $\dagger$.

XLVII. Ordnung: *Loranthaceae* Don.

- 361. *Viscum album* L.** Auf Bäumen schmarozend im Hirschgarten, in den Isaranlagen, bei Grossheselohe; Gauting. β^3 α^2 $\dagger$.

XLVIII. Ordnung: *Caprifoliaceae* Juss.

- 362. *Adoxa Moschatellina* L.** Laubwälder z. B. bei Mariaeinsiedl, Gauting, in den Remisen hinter der Bavaria, Schleissheim. β^3 α^3 $\dagger$.
263. *Sambucus Ebulus* L. Waldränder: von Hese-lohe bis Bayerbrunn; Schleissheim im Bergelholz: P.; nördliche Hügelreihe. β^3 α^2 $\dagger$.
364. — *nigra* L. In Hecken und Wäldern z. B. Fasangarten bei Perlach, obere Isarauen. β^4 α^2 $\dagger$.
365. — *racemosa* L. Auf Waldschlägen der nördlichen Hügelreihe, in der Schlucht zwischen Deining und der Isar: K. β^2 α^2 $\dagger$.

366. **Viburnum Lantana** L. Auen, Triften und Wälder. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$. 5
367. — **Opulus** L. Auen, Bachufer, Gebüsch. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
— **Lonicera Caprifolium** L. Bei der Georgenschwaige und in der Hirschau verwildert: P.
368. **Lonicera Periclymenum** L. Am Bergerl bei Schleissheim: E. $\beta \alpha^2 \dagger$.
369. — **Xylosteum** L. Hecken und Wälder. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
370. — **nigra** L. In den Isarauen bei Schäftlarn: S. $\beta \alpha \dagger$.
371. — **alpigena** L. Mit voriger. $\beta \alpha^3 \dagger$.

IL. Ordnung: **Stellatae** L.

372. **Sherardia arvensis** L. Auf Saatfeldern und Brachen. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
373. **Asperula taurina** L. Englischer Garten: S. $\beta \alpha$.
374. — **tinctoria** L. Haiden bei Garching und Ismaning; sonnige Abhänge bei Geiseltasteig bis Grünwald. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
375. — **cynanchica** L. Haideewiesen, trockne Triften, Strassengräben. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
 β . **montana** Koch. Auf Haiden: P.
376. — **odorata** L. Feuchte schattige Abhänge z. B. bei Deisenhofen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
377. **Galium Cruciata** Scop. Auen, Wiesen und Triften. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
378. — **Aparine** L. Felder, Hecken und Wiesen. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
 β . **Vailantii** Koch und
 δ . **spurium** Koch mit der Stammform.

379. **Galium uliginosum** L. Moore und Pfützen.
 $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
380. — **palustre** L. Moore und Gräben. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
381. — **rotundifolium** L. In schattigen Wäldern.
 $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
382. — **boreale** L. Auen, Haiden und Triften. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
383. — **verum** L. Haiden, Wiesen und Auen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
 β . **ochroleucum** Wolf. Mit der Stammart.
384. — **sylvaticum** L. Laubwälder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
385. — **Mollugo** L. Auf Wiesen, an Wegrändern und
in Wäldern. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
386. — **sylvestre** Poll. Haiden und Wegränder. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
387. — **helveticum** Weig. Am Isarkies: Koch, S. $\beta \alpha$.

L. Ordnung: *Valerianeae* DC

388. **Valeriana officinalis** L. Auen, Triften und
Moore. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
 α . **exaltata** (V. **exaltata** Mikan) zwischen
Grafrath und Bruck: H.
 β . **minor** Koch. Schleissheim.
 γ . **V. sambucifolia** Mikan. Im Grünwalder-
forst: M., P.; in den Isarauen und bei
Starnberg am See: K.
389. — **dioica** L. Auen, nasse Wiesen, Moore. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
390. — **montana** L. Isarkies: S. $\beta \alpha$.
391. **Valerianella olitoria** Poll. Aecker und Gärten.
 $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
392. — **Morisonii** DC. Wie vorige. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
 α . **leiocarpa** Koch. Schleissheim: P.
 β . **lasiocarpa** Koch. Häufig.

393. — *Auricula* DC. Auf Feldern z. B. Starnberg, Feldmoching, Fröttmaning, Garching. $\beta^3 \times^3 \dagger$.

α . *leiocarpa* Koch. Nördliche Hügelreihe und Schleissheim: P.

β . *lasiocarpa* Koch. Häufig.

LI. Ordnung: *Dipsaceae* DC.

394. **Dipsacus** *sylvestris* Mill. Felder und Zäune. $\beta^4 \times^3 \dagger$.

395. — *pilosus* L. Am Eingange des Klosters Schäftlarn. $\beta \times^2 \dagger$.

396. **Knautia** *sylvestris* Dub. In Gebüsch und Wäldern. $\beta^5 \times^4 \dagger$.

397. — *arvensis* Coult. Wiesen und Haiden. $\beta^5 \times^5 \dagger$.

398. **Succisa** *pratensis* Mönch. Wiesen und Moore. $\beta^5 \times^5 \dagger$.

399. **Scabiosa** *columbaria* L. Wiesen und Auen. $\beta^5 \times^5 \dagger$.

400. — *suaveolens* Desf. Auf der Garchingerhaide, auf trocknen Wiesen und Wegrändern z. B. Haching, Milbertshofen. $\beta^4 \times^4$.

LII. Ordnung: *Compositae* Adans.

401. **Eupatorium** *cannabinum* L. Auen, Ufer, Gebüsche. $\beta^5 \times^4 \dagger$.

402. **Adenostyles** *alpina* Bl. et Fing. Isarthal ober Grünwald: Pirngruber. $\beta \times$.

403. **Tussilago** *Farfara* L. Auen, Ufer, Strassengräben. $\beta^5 \times^5 \dagger$.

404. **Petasites officinalis** Mönch. Würm- und Ampergebiet; Hirschau. $\beta^3 \kappa^3 \dagger$.
405. — *albus* Gärt. In einer Schlucht zwischen Deining und der Isar: K., H. $\beta \kappa^3 \dagger$.
406. — *niveus* Baumg. An den Isarabhängen und in den Isarauen. $\beta^2 \kappa^4 \dagger$.
407. **Linosyris vulgaris** Cass. Auf der Garchingerhaide zwischen Mallertshofen, Grünau und Dittersheim: S. $\beta \kappa^4 \dagger$.
408. **Aster Amellus** L. An den Abhängen bei der Menterschwaige; auf der Garchingerhaide bis Neuherberg. $\beta^2 \kappa^4 \dagger$.
- *Novi-Belgii* L. Am Ufer des Isarkanals zwischen Garching und dem Aumeister. P., K. $\beta \kappa^2$.
- *parviflorus* N. ab E. Freimann: P.; Isarkies: K. $\beta \kappa$.
- *chinensis* L. Verwildert hie und da z. B. um Schleissheim, in den Isarauen bei Föhring.
409. **Bellidiastrum Michelii** Kass. An den Abhängen der oberen Isar; waldige Abhänge um Starnberg: P. $\beta^2 \kappa^4 \dagger$.
410. **Bellis perennis** L. Wiesen. $\beta^5 \kappa^5 \dagger$.
411. **Stenactis bellidiflora** Al. Br. An Ackerrändern bei Gross-Nöhenbach auf der nördlichen Hügelreihe: E., K. $\beta \kappa^2 \dagger$.
412. **Erigeron canadensis** L. Auen, Waldschläge. $\beta^5 \kappa^3 \dagger$.
413. — *acris* L. Auen, Haiden, Brachen. $\beta^5 \kappa^3 \dagger$.
414. — *droebachensis* Mill. Mit vorigem in den Isarauen. $\beta \kappa^4 \dagger$.
415. **Solidago Virga aurea** L. Wälder. $\beta^5 \kappa^3 \dagger$.

416. **Bupthalmum salicifolium** L. Auen, trockene Wiesen und Abhänge. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
 β . *angustifolium* Koch. Schwarzhölzl am Dachauermoor: K.
417. **Inula salicina** L. Moore bei Moosach; trockene Wiesen bei Grünwald. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
418. — *hirta* L. Garchingerhaide; am Rande des Kapuzinerhölzls gegen Hartmannshofen: S. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.
419. — *Conyza* DC. An den Abhängen bei Pullach und Grünwald. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
420. **Pulicaria dysenterica** Gärt. In den Isar- und Amperauen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
421. **Bidens tripartita** L. Moore und Pfützen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
422. — *cernua* L. Moore und Gräben. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
 β . *radiata* Koch. Föhring: P., Aubing: K.
 γ . *minima* L. Deiningermoos: P.; Dachauer-
moos: K.
— *Helianthus annuus* L. Verwildert am Isarstrand bei Föhring: P., K.
423. **Filago germanica** L. Brachen und Triften z. B. Harlaching: S., Milbertshofen: P., Feldkirchen. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
424. — *arvensis* L. Aecker und Brachen z. B. bei Harlaching: S., Milbertshofen P. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
425. **Gnaphalium sylvaticum** L. Waldschläge. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
426. — *uliginosum* L. Im Dachauermoos; Felder bei Berg am Laim, Milbertshofen: P. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
427. — *luteo-album* L. Nördliche Hügelreihe: E. $\beta \alpha^2$.

428. **Gnaphalium dioicum** L. Trockene Felder, lichte Wälder und Haiden. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

— *marginatum* L. An den Isarabhängen bei Grossheselohe verwildert: K.

429. **Artemisia vulgaris** L. Felder, Wege. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.

— *Absinthium* L. Verwildert am Isarufer bei Grünwald: P.

430. **Tanacetum vulgare** L. An der Hecke bei der Georgenschwaige einzeln; häufig auf der nördlichen Hügelreihe: E. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.

431. **Achillea Millefolium** L. Wiesen und Aecker. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

γ . *lanata* Koch. Auf der Garchingerhaide: Lorenz.

432. **Anthemis arvensis** L. Auen, Aecker und Wege. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

433. — *Cotula* L. Auf den Aeckern zwischen Schleissheim und der Fasanerie: P. $\beta \alpha^3 \dagger$.

434. **Chrysanthemum Leucanthemum** L. Wiesen, Haiden und Auen. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.

435. — *montanum* L. Am Isarkies. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.

β . *heterophyllum* Koch mit der Stammform.

436. — *coronopifolium* Vill. Am Isarkies. $\beta \alpha^2 \dagger$.

437. — *corymbosum* L. Waldränder, Gebüsch, Abhänge. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

438. — *inodorum* L. An Gräben bei Moosach: K.; Aecker zwischen Schleissheim und der Fasanerie: P. $\beta \alpha^3 \dagger$.

439. **Arnica montana** L. Dachauermoos und auf trockenen Wiesen z. B. Nymphenburg, Feldkirchen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

440. **Cineraria** *spathulaefolia* Gmel. Im Dachauer- und Deininger Moor; auf feuchten Wiesen bei Freimann, Olching und Starnberg: P. $\beta^2 \times^3 \dagger$.
441. **Senecio** *vulgaris* L. Auf Schutt, an Strassen und in Gärten. $\beta^5 \times^5 \dagger$.
442. — *sylvaticus* L. Waldschläge. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
443. — *viscosus* L. Bei der Schwimmschule: P.; Schleissheim an der Façade des Schlosses: E. $\beta^2 \times^3 \dagger$.
444. — *erucaefolius* L. Auen. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
 β . *tenuifolius* Jacq. Dachauer Moor.
445. — *Jacobaea* L. Wiesen und Raine. $\beta^5 \times^3 \dagger$.
 β . *discoideus* Koch. Unter der Stammform.
446. — *aquaticus* Huds. Dachauer Moor; feuchte Wiesen bei Biederstein und Thalkirchen: S. $\beta^3 \times^4 \dagger$.
447. — *nemorensis* L. Waldränder wie Menzinger- und Echingerlohe, Grünwald. $\beta^3 \times^2 \dagger$.
 β . *Fuchsii* Koch. Starnberg: K.
448. — *paludosus* L. Dachauer Moos: Ohmüller; Graf- rath am Ammersee: H. $\beta \times^2 \dagger$.
449. **Cirsium** *lanceolatum* Scop. Auen, Wege und Triften. $\beta^5 \times^3 \dagger$.
 β . *C. nemorale* Rchb. In Wäldern bei Har- laching: P., und Schleissheim: E.
450. — *palustre* Scop. Nasse Wiesen, Moore. $\beta^5 \times^4 \dagger$.
451. — *oleraceum* Scop. Feuchte Wiesen und Moore. $\beta^4 \times^5 \dagger$.
var. capitulis atropurpureis! unter der Stamm- form oft am Dachauer Moor: K.

452. **Cirsium rivulare** Link. Feuchte Wiesen und Moore. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
 — *heterophyllum* All. Im Walde bei Bernried am Würmsee: K. $\beta \times^2 \dagger$.
453. — *bulbosum* DC. Moore, feuchte Wiesen und Auen. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
454. — *acaule* All. Garchingerhaide; Schleissheim um die Pechhütte: E., am Canal zwischen Dachau und Schleissheim: K. $\beta^2 \times^3 \dagger$.
 β . *caulescens* mit der Stammform.
455. — *arvense* Scop. Auen, Felder und Wälder. $\beta^5 \times^5 \dagger$.
 α . *horridum* Koch besonders auf Aeckern;
 β . *mite* Koch. Isarauen und Wälder.
 δ . *vestitum* Koch. Mit den vorigen, jedoch seltener.
456. — *palustri-oleraceum* Naegeli. Unter den Stammeltern z. B. Schleissheim, Thalkirchen: B. $\beta \times \dagger$.
457. — *oleraceo-palustre* Schiede. Thalkirchen, Dachauermoos; Freimann: B.; Hirschau, Pullach: P. $\beta^3 \times^2 \dagger$.
458. — *palustri-rivulare* Schiede. Deining: B., P. $\beta \times \dagger$.
459. — *rivulari-palustre* Naegeli. Dachauermoos, Deiningermoor, Starnberg: K.; Leutstetten: M. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
460. — *palustri-bulbosum* Naegeli. Dachauermoos; Freimann: S.; Isarauen: K. $\beta^2 \times^2 \dagger$.
461. — *bulboso-palustre* Naegeli. Moosach, Schleissheim: B., P., K. $\beta \times \dagger$.

462. **Cirsium oleraceo-rivulare** DC. Dachauermoos; Mariaeinsiedl, Thalkirchen: S.; Gauting, Starnberg, Potsham: K.; Lohhausen: P. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
463. — *rivulari-oleraceum* Brügger. Dachauermoos; Mariaeinsiedl, Thalkirchen: B., P.; Starnberg: K. $\beta^2 \alpha \dagger$.
464. — *oleraceo-bulbosum* Koch. Dachauermoos; Hirschau: P., Freimann: M. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
465. — *bulboso-oleraceum* Koch. Dachauermoos; Freimann: B., P. Isarauen: Böck. $\beta^2 \alpha \dagger$.
466. — *bulboso-rivulare* Al. Br. Moosach: B.; H., K. $\beta \alpha \dagger$.
467. **Carduus acanthoides** L. Brachen, Wege und Auen. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
468. — *crispus* L. An Hecken in Aubing, Deining und Dingharting: P. $\beta^2 \alpha^2$.
469. — *Personata* Jacq. Isarauen bei München und Ebenhausen: K. $\beta \alpha^3 \dagger$.
470. — *defloratus* L. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
 γ . *summanus* Pollin. Garchingerhaide; trockene Wiesen bei Ismaning: P.
 δ . *rhaeticus* DC. Dachauermoos, Isarauen; Lohhausen: P.
471. — *nutans* L. Wege und Triften. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
472. — *acanthoidi-nutans* Koch. Unter den Stammeltern bei Feldkirchen: K.; Schleissheim: P. $\beta \alpha \dagger$.
473. — *nutanti-acanthoides* Koch. Feldmoching: S; Eisenbahndamm, Georgenschwaige, Schleissheim, Schwabing: P.; Feldkirchen: K.; Theresienwiese: B. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

474. **Onopordon Acanthium** L. Wege und Schutt in Milbertshofen und Schleissheim. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.
475. **Lappa major** Gärt. Wege und Schutt. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.
476. — *minor* DC. An ähnlichen Orten wie vorige. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
477. — *tomentosa* Lam. Ebenso. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
478. **Carlina acaulis** L. Haiden, trockene Wiesen und Abhänge. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
479. — *vulgaris* L. Auen, Haiden und Abhänge. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
480. **Serratula tinctoria** L. Waldschläge, Hecken, Moore. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
481. **Centaurea amara** L. Garchingerhaide. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.
482. — *Jacea* L. Wiesen, Triften, Haiden und Moore. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
- *pratensis* Thuill. Mit der Stammform.
483. — *phrygia* L. Waldränder an der nördlichen Hügelreihe bei Heimhausen: E. und bei Ebenhausen: S. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
484. — *montana* L. In den Wäldern des Isarthals. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
485. — *axillaris* Willd. Garchingerhaide bis Milbertshofen. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
486. — *Cyanus* L. Aecker. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
487. — *Scabiosa* L. Wiesen, Triften und Haiden. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
488. — *maculosa* Lam. Garchingerhaide; bei Moosach in Kiesgruben; Bogenhausen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
- 489. **Lapsana communis** L. Waldschläge, Hecken, Felder und Abhänge. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.

490. **Aposeris foetida** Less. In den Laubwäldern des Isarthals und im Menzinger Lohe. $\beta^3 \alpha^5 \dagger$.
491. **Cichorium Intybus** L. Strassenränder und Triften. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
492. **Leontodon autumnalis** L. Wiesen und Triften. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
493. — *hastilis* L. Wiesen, Haiden, Auen und Moore. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
 β . *glabratus* Koch mit der Stammform.
494. — *incanus* Schrank. Garchingerhaide, trockne Wiesen bei Moosach, Isarauen, Abhänge der Isar bei der Menterschwaige. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
495. **Picris hieraciodes** L. In den Isarauen und am Eisenbahndamm bei Lohhausen. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
496. **Tragopogon orientalis** L. Wiesen und Auen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
497. — *pratensis* L. In Strassengräben neben der Garchinger- und Dachauerstrasse: K., auf gleichen Standorten um Schleissheim und Milbertshofen: P.; Thalkirchen: B. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
498. **Scorzonera humilis** L. Garchingerhaide, Dachauermoos. $\beta^3 \alpha^5 \dagger$.
 β . *elator*: Neuherberg: B.; Isarauen: K.
499. — *purpurea* L. Garchingerhaide bis Neuherberg und Freimann. $\beta^2 \alpha^5 \dagger$.
500. **Hypochoeris radicata** L. Wiesen, Triften, Waldschläge. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
501. — *maculata* L. Garchingerhaide; trockene Wiesen bei Hartmannshofen und Grünwald. $\beta^3 \alpha^5 \dagger$.

502. **Taraxacum officinale** Wigg. Wiesen, Haiden, Moore und Triften. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.

α . *genuinum* Koch. z. B. Garchingerhaide.

β . *lividum* Koch. Moore.

503. **Chondrilla prenanthoides** L. Isarkies. $\beta \alpha^2 \dagger$.

504. **Prenanthes purpurea** L. Wälder und Abhänge. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$

β . *angustifolia* Koch. Im Wald bei Geiseltasteig: B.

505. **Lactuca muralis** Fres. Auf Schutt und Abhängen. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.

506. **Sonchus oleraceus** L. Auf Schutt, an Abhängen, in Gärten und Aeckern. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

507. — *asper* Vill. Wie voriger. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.

508. — *arvensis* L. Aecker. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.

509. **Crepis taraxicifolia** Thuill. Auf Aeckern und Wiesen um Deining; Bayerbrunn, Starnberg, besonders häufig um Berg: S., Haching: K., Grünwald und Pasing: B., Freimann: v. Spitzl. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.

510. — *praemorsa* Tausch. An den Isarabhängen bei Grünwald und Pullach; in den Isarauen; Haine um Schleissheim; Garchingerhaide. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.

511. — *alpestris* Tausch. Haiden, Wiesen z. B. Biederstein, Schleissheim, Moosach, Perlach. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

512. — *virens* Vill. Aecker, Triften und Wege. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.

513. — *biennis* L. Auen, Wiesen und Triften. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

514. — *tectorum* L. Kiesgruben, Haiden, Brachen, auf Schutt. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

515. **Crepis paludosa** Mönch. Dachauermoos; auf feuchten Wiesen um Starnberg, Deining; Petersbrunn: P. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
516. — *succisaefolia* Tausch. Schwarzhölzl im Dachauermoos; feuchte Wiesen z. B. bei Freimann, Hirschau, Nymphenburg, Harlaching, Isarauen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
517. **Hieracium Pilosella** L. Haiden, Wiesen, Auen, Abhänge und Moore. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
var. scapo furcato, 2 — 3 *cephalo*: Biederstein: P., Garchingerhaide: K.
ε. grandiflorum DC. Schleissheim: E.
518. — *Hoppeanum* Schult. Garchingerhaide. $\beta \alpha^4 \dagger$.
519. — *Pilosella-praealtum* (acutifolium Vill. sec. Sendtner.) Biedersteiner Abhänge, Schwabinger Kiesgrube: S., Schwimmschulcanal: B., P. Isarauen: K. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.
520. — *praealto-Pilosella* (stoloniflorum W. et Kit. sec. Sendtner.) Bei der Menterschwaige: B., Isarkies, Biederstein, Schwimmschulcanal: P., B.; an Grabenrändern der Moore von Moosach und Schleissheim: S.; Brachen bei Neuhofen: K.; in Kiesgruben zwischen Fröttmaning und Garching: Schwarzmänn. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.
521. — *praealtum* Wimm. et Grab. Wiesen, Auen, Haiden und Triften. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
α. setoso-ciliatum Schulz. Biederstein, Milbertshofen, Isarkies: P.

β . *setosum* Schulz. Deining, Schwabing, Schäftlarn: P.

γ . *hirsutum* Schulz. Deining, Freimannerhaide, Schwimmschule: P.

522. **Hieracium florentinum** All. Isarauen und Abhänge der Isar. $\beta^2 \times^3 \dagger$.

523. — *Auricula-praealtum* An Moorgräben bei Moosach: K. $\beta \times \dagger$.

524. — *Auricula* L. Wiesen, Haiden, Moore, Wegränder. $\beta^5 \times^4 \dagger$.

525. — *aurantiacum* L. Auf einer Kiesbank bei Brunnthal: Büchele. $\beta \times$.

526. — *pratense* Tausch. Berg am Laim: Berger; Haching auf Aeckerrändern: K.; Georgenschwaige und Grünwald: M., Fussweg von Milbertshofen nach Schleissheim: B., Hirschau und Schwimmschule: P. $\beta^3 \times^2 \dagger$.

527. — *cymosum* L. Abhänge bei Mariaeinsiedl: S. $\beta \times^2$.

528. — *glaucum* All. Abhänge der Isar bei der Menter-schwaige; am Isarkies. $\beta^2 \times^3 \dagger$.

529. — *staticifolium* Vill. Am Isarkies; an den kiesigen Abhängen bei der Menter-schwaige und bei Biederstein. $\beta^2 \times^5 \dagger$.

530. — *laevigatum* W. Griseb. Abhänge der Isar bei der Menter-schwaige; am Isarkies. $\beta^2 \times^2 \dagger$.

531. — *caesium* Fries. Abhänge der Isar zwischen Föhring und Bogenhausen: S., bei der Menter-schwaige; Isarauen. $\beta^2 \times^3 \dagger$.

532. **Hieracium ramosum** Kit. Mengerschwaige, Isarauen. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
533. — *vulgatum* Fries. Auen, Wälder, Wiesen und Abhänge. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
 α . *genuinum* Fries. Bayerbrunn: S.
 β . *rosulatum* Fries. Isarauen; Schwabing, Mariaeinsiedl: S.
 γ . *medianum* Griseb. Moorwiesen bei Carolinenfeld: S.
534. — *murorum* L. Auen, Abhänge Schutt. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 β . *sylvaticum* L. Wälder z. B. Harlaching, Pullach, Nymphenburg.
535. — *tridendatum* Fries. Kapuzinerhölzl, Bayerbrunn: S.; Menzingerlohe, Aubing: P.; nördliche Hügelreihe: E. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.
var. incisoserratum Sendt. Bayerbrunn: S.
536. — *boreale* Fries. Waldränder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
v. lactucaceum Fröl. Nördliche Hügelreihe.
537. — *umbellatum* L. Hecken, Waldschläge, Abhänge. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
 β . *limonium* Grieseb. Garchingerhaide.

LIII. Ordnung: *Campanulaceae* Juss.

538. **Jasione montana** L. Nördliche Hügelreihe: E.
 $\beta \alpha^3 \dagger$.
539. **Phyteuma orbiculare** L. Wiesen, Abhänge und Moore. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

540. **Phyteuma spicatum** L. Abhänge bei Heselohe und Pullach; Haine bei Schleissheim; Echinger Lohe. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
541. **Campanula pusilla** Hänke. Am Isarkies. $\beta \alpha^4 \dagger$.
542. — *rotundifolia* L. Wiesen. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
543. — *rapunculoides* L. Hecken, Wälder, Triften. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
544. — *Trachelium* L. Hecken, Wälder und Zäune. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 β . *dasycarpa* Koch. Echinger Lohe.
545. — *patula* L. Wiesen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
546. — *persicifolia* L. Abhänge, Gebüsche, Wälder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
547. — *glomerata* L. Haiden, Wiesen und Triften. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
 γ . *aggregata* Willd. z. B. Garchingerhaide.
 δ . *speciosa* Hornem. z. B. Schleissheim und Garching.
548. **Specularia Speculum** DC. Saatfelder. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

LIV. Ordnung: *Vaccineae* DC.

549. **Vaccinium Myrtillus** L. Wälder. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
550. — *uliginosum* L. Deininger- und Dachauermoor. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
551. — *Vitis idaea* L. Wälder. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
552. — *Oxycoccus* L. Deiningermoos; Schwarzhölzl am Dachauermoor. $\beta^2 \alpha^5 \dagger$.

LV. Ordnung: *Ericineae* Desv.

553. **Arctostaphylos officinalis** Wimm. et Grab. Garchingerhaide und Abhänge der Isar. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.
 554. **Andromeda polifolia** L. Deiningermoor. $\beta \alpha^4 \dagger$.
 555. **Calluna vulgaris** Salisb. Haiden, Wälder und Filze. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
 556. **Erica carnea** L. Isarabhänge, Isarauen, Garchingerhaide. $\beta^3 \alpha^5 \dagger$.

LVI. Ordnung: *Pyrolaceae* Lindl.

557. **Pyrola rotundifolia** L. Isarauen. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$. 6
 558. — *chlorantha* Sw. In Wäldern um Heselohe und Hadern. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$. 6
 559. — *media* Sw. Im Wald bei Heselohe: Ohmüller; Schwarzhölzl am Dachauermoos: E. $\beta \alpha \dagger$. 6
 560. — *minor* L. Nadelwälder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 6
 561. — *secunda* L. Nadelwälder z. B. Höhenkirchen, Perlach, Grünwald. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
 562. — *uniflora* L. Grünwalder Park: H.; im Wald zwischen Starnberg und Ebenhausen. $\beta^2 \alpha$. 5
 563. — *umbellata* L. In einem Wald bei Planegg: Ohmüller. $\beta \alpha$.

LVII. Ordnung: *Monotropeae* Nutt.

564. **Monotropa Hypopitys** L. Nadelwaldungen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
 α. glabra Koch. z. B. Haching.
 β. hirsuta Koch. z. B. Starnberg.

III. Unterklasse: Corolliflorae.

LVIII. Ordnung: Oleaceae Lindl.

565. **Ligustrum vulgare** L. Auen, Wälder und Hecken. $\beta^5 \times^3 \dagger$.

566. **Fraxinus excelsior** L. Auen und Wälder. $\beta^3 \times^2 \dagger$.

LIX. Ordnung: Asclepiadeae R. Br.

567. **Cynanchum Vincetoxicum** R. Br. Auen, Wälder und Hecken. $\beta^4 \times^3 \dagger$.

β . *laxum* Bartl. Menterschwaige: B.

— *Asclepias syriaca* L. Verwildert bei Schleissheim: S.; am Moosacher Fasangarten.

LX. Ordnung: Apocyneae R. Br.

568. **Vinca minor** L. In Wäldern z. B. Perlach, Gauting; in den Remisen bei der Georgenschwaige. $\beta^3 \times^3 \dagger$.

LXI. Ordnung: Gentianeae Juss.

569. **Menyanthes trifoliata** L. Dachauermoos; bei Potzham; am Würm- und Amperufer. $\beta^3 \times^4 \dagger$.

570. **Swertia perennis** L. Auf feuchten Wiesen zwischen Starnberg und Possenhofen; zwischen Starnberg und Leutstetten; am Dachauermoos vor dem Schwarzhölzl: Arnold., K. $\beta^2 \times^3 \dagger$.

571. **Gentiana cruciata** L. Haiden und Triften.
 $\beta^4 \alpha^2 \dagger$. 7
572. — *asclepiadea* L. Isarauen. $\beta \alpha^3 \dagger$. 8
573. — *Pneumonanthe* L. Moore und sumpfige Wiesen.
 $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 7
574. — *acaulis* L. Dachauermoos; Garchingerhaide;
 Isarauen. $\beta^3 \alpha^5 \dagger$. 6
 β . *caulescens*. Mit der Stammform.
575. — *verna* L. Haiden, Wiesen, Auen und Morre.
 $\beta^5 \alpha^5 \dagger$. 4
576. — *utriculosa* L. Dachauermoos; Isarauen. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$. 6
577. — *germanica* Willd. Wiesen, Haiden und Triften.
 $\beta^4 \alpha^5 \dagger$. 8
578. — *ciliata* L. Haiden, trockene Wiesen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$. 8
579. **Erythraea Centaurium** Pers. Auen und Wiesen.
 $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
 β . *capitata* Koch mit voriger z. B. Dinghar-
 ting: P., Hirschau: K.
580. — *pulchella* Fries. Auen, Triften, feuchte Wie-
 sen und Moore. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

LXII. Ordnung: *Polemoniaceae* Lindl.

Polemonium coeruleum L. Hin und wieder verwildert.

LXIII. Ordnung: *Convolvulaceae* Juss.

581. **Convolvulus sepium** L. Hecken, Wiesen und
 Zäune. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
582. — *arvensis* L. Felder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

583. **Cuscuta europaea** L. An Zäunen und Hecken bei Haching, Deining, Georgenschwaige. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
584. — **Epithymum** L. Haidewiesen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
585. — **Viciae Koch.** Schleissheim auf *Vicia sativa*: S. $\beta \alpha^4$.
586. — **Epilinum Weihe.** Ebenhausen: v. Spitzl; Deining: B.; Grünwald: P. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.

LXIV. Ordnung: *Boragineae Desv.*

587. **Cynoglossum officinale** L. Auf Schutt; bei Moosach im Dachauermoor, Abhänge bei Grünwald und Wege bei Freimann. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.
— *Borago officinalis* L. Hie und da verwildert.
588. **Anchusa officinalis** L. Felder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
589. **Lycopsis arvensis** L. Nördliche Hügelreihe: E. $\beta \alpha^4 \dagger$.
590. — **Symphytum officinale** L. An Gräben Bachufer, auf feuchten Wiesen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
591. — *tuberosum* L. Wälder im Isarthal; Starnberg; Menzingerlohe, Schleissheim. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
592. **Cerinth minor** L. Auf Feldern. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
593. **Echium vulgare** L. Auen und Triften. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
594. **Pulmonaria officinalis** L. Haine, feuchte Wiesen, Gebüsch. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
595. — *angustifolia* L. Um die Fasanerie bei Moosach. $\beta \alpha^3 \dagger$.
596. — *azurea Bess.* In einer Remise bei der Schwimmschule: S. $\beta \alpha^2 \dagger$.

597. **Lithospermum officinale** L. Felder und Auen. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
598. — *arvense* L. Felder. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
599. **Myosotis palustris** With. Bach- und Grabenränder, sumpfige Wiesen. $\beta^5 \times^4 \dagger$.
600. — *sylvatica* Hoffm. Wälder der nördlichen Hügelreihe: E. $\beta \times$.
601. — *intermedia* Link. Felder, Auen. $\beta^5 \times^4 \dagger$.
602. — *hispida* Schlecht. Felder und Schutt. $\beta^3 \times^2 \dagger$.
603. — *versicolor* Pers. Römerschanze im Grünwalder Parke: K.; Deiningermoos. $\beta \times^3 \dagger$.
604. — *stricta* Link. Moosach in einer Sandgrube: S., Theresienwiese. $\beta^2 \times^3 \dagger$.

LXV. Ordnung: *Solaneae* Juss.

605. **Solanum nigrum** L. In Gärten, auf Schutt, an Wegen. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
606. — *Dulcamara* L. Auen und Hecken. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
607. **Physalis Alkekengi** L. Hirschau: Engert. $\beta \times^2$.
608. **Atropa Belladonna** L. Waldschläge. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
609. **Hyoscyamus niger** L. Auf Schutt, an Wegrändern und Abhängen. $\beta^4 \times^2 \dagger$.

LXVI. Ordnung: *Verbasceae* Bartl.

610. **Verbascum Schraderi** Mey. Felder, Abhänge und Sandgruben. $\beta^5 \times^3 \dagger$.
611. — *thapsiforme* Schrad. An ähnlichen Orten, aber mehr im Norden von München, als gegen Süden verbreitet. $\beta^3 \times^2 \dagger$.

612. **Verbascum Lychnitis** L. Felder, Wiesen, Weg-
ränder. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
613. — *nigrum* L. An ähnlichen Standorten. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
614. — *phoeniceum* L. Auf Aeckern und Brachen um
Perlach, Berg am Laim, Haching, Nymphenburg;
einmal um Schleissheim gefunden: E. $\beta^3 \times^4 \dagger$.
615. — *Blattaria* L. An den Ufern der Isarcanäle im
Hofgarten bei Schleissheim: E. $\beta \times \dagger$.
616. — *Thapso-Lychnitis* M. et K. Auf Triften bei
Freimann: M.; Schleissheim: E; Milbertshofen:
K. $\beta^2 \times^2 \dagger$.
617. — *thapsiformi-Lychnitis* Schiede. Freimann: M.,
Schleissheim: E. $\beta \times^2 \dagger$.
618. — *nigro-Thapsus*. Moosach in Kiesgruben: K. $\beta \times \dagger$.
619. — *nigro-Lychnitis* Schiede. Biederstein und Frei-
mann: M.; Schleissheim: E.; Moosach und Neu-
freimann in Kiesgruben: K. $\beta^2 \times \dagger$.
620. — *nigro-phoeniceum* W. Schulz. Berg am Laim;
Perlach; Unterhaching gegen den Josephenhof
zu: K. $\beta \times^2 \dagger$.
621. — *phoeniceo-nigrum*. Mit vorigem: K. $\beta \times \dagger$.
622. **Scrophularia nodosa** L. Wälder, Auen und
Wiesen. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
623. — *Ehrharti* Steven. An Ufern, Büschen und
Gräben: z. B. bei Mariaeinsiedl bis Menter-
schwaige, Starnberg; Aumeister: P. $\beta^3 \times^2 \dagger$.
624. — *Neesii* Wirtgen. An ähnlichen Standorten: bei
Thalkirchen, Feldmoching, Schleissheim, Starn-
berg: S., Aubing, Lohhausen, Hirschau: P. $\beta^3 \times^2 \dagger$.

LXVII. Ordnung: *Antirrhineae* Juss.

625. **Digitalis grandiflora** Lam. Wälder, z. B. Deining, nördliche Hügelreihe. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
 β . *acutiflora* Koch. Zwischen Hartmannshofen und Moosach in einer Remise: S.
626. **Antirrhinum Orontium** L. Kiesstellen um die Bavaria: B., M. $\beta \alpha \dagger$.
627. **Linaria spuria** Mill. Starnberg: Einsele. $\beta \alpha$.
628. — *minor* Desf. Kiesbänke und Aecker. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
629. — *alpina* Mill. Am Isarkies. $\beta \alpha^3 \dagger$.
630. — *vulgaris* Mill. Felder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
631. **Veronica scutellata** L. Deiningermoor und Dachauermoor. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
632. — *Anagallis* L. Bäche, Quellen, Gräben, Moore. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
633. — *Beccabunga* L. An ähnlichen Stellen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
634. — *urticifolia* L. Wälder im Isarthal. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
635. — *Chamaedrys* L. Wiesen, Haiden und Wälder. $\beta^5 \alpha^5$.
636. — *montana* L. Zwischen Gauting und dem Mühlthal: S., Ebenhausen: P., Deiningerschluft: K. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$. $\sum$
637. — *officinalis* L. Wälder und Haiden. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
638. — *aphylla* L. Nur einmal am Isarkies gefunden. $\beta \alpha$.
639. — *Schmidtii* Röm. et Sch. Garchingerhaide bis Neuherberg. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.

640. **Veronica latifolia** L. Aecker, Wiesen, Abhänge. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
641. — *spicata* L. Haiden und trockene Wiesen. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
 α . *vulgaris* Koch. Milbertshofen, Biederstein: P.
 β . *orchidea* Crantz. Garching, Hartmannshofen: P.
642. — *alpina* L. Isarkies. $\beta \alpha$.
643. — *serpyllifolia* L. Wiesen, Auen, Aecker, Wälder. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
644. — *arvensis* L. Felder. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
645. — *triphyllos* L. Aecker, z. B. um Gauting: H.; Bogenhausen, Milbertshofen: P.; Sendling: K. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
646. — *praecox* All. Auf Aecker um Giesing: S., Nymphenburg: v. Spitzl; Schleissheim, Feldmoching, nördliche Hügelreihe: E. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.
647. — *agrestis* L. Heselohe, Dingharding, Türkenfeld: B. $\beta^2 \alpha^2$.
648. — *polita* Fries. Felder. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
649. — *opaca* Fries. Auf Saatfeldern bei Dingharding und Türkenfeld: B. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.
650. — *Buxbaumii* Ten. Felder und Wiesen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
651. — *hederaefolia* L. Felder und Auen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
652. **Limosella aquatica** L. Im Holzgarten: Zuccharini; am Weg nach Föhring: H.; bei Moosach in einer Kiesgrube: P.; Mamhofen bei Starnberg: Einsele. $\beta^2 \alpha^3$.

LXVIII. Ordnung: *Orobanchae* Koch.

653. **Orobanche** *cruenta* Bert. Auen und Wiesen.
 $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
654. — *Epithymum* DC. Auf Haiden und Wiesen:
Garchingerhaide, Feldmoching, Menterschwaige,
Mariaeinsiedl, Thalkirchen: S., Freimann: P.;
in Kiesgruben bei Moosach, Haching, Feldkir-
chen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
655. — *Galii* Dub. Remisen bei Hartmannshofen;
Ackerränder bei Moosach und Haching: K. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.
656. — *rubens* Wallr. Aecker und Strassenränder.
 $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
657. — *flava* Mart. Isarufer bei Geiseltasteig bis
Grünwald; Pullach: K. $\beta \alpha^2 \dagger$.
658. — *lucorum* Al. Braun. Englischer Garten: S.
Deining: M. $\beta \alpha^2 \dagger$.
— *coerulescens* Steph. Wird von Sulp. Kurz um Forsten-
ried angegeben.
659. — *coerulea* Vill. Remisen hinter der Bavaria; um
Perlach: Kurz; zwischen Perlach und Haching
auf *Thymus serpyllum* schmarozend und zwischen
dem Warthof und Harlaching: K. $\beta^2 \alpha \dagger$.
660. **Lathraea** *squamaria* L. In Laubwäldern: Eng-
lischer Garten; Mariaeinsiedl; Gauting: Einsele.
 $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.

LXIX. Ordnung: *Rhinanthaceae* DC.

661. **Melampyrum** *cristatum* L. Bei der Moosacher
Fasanerie und im Echingerlohe. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.

662. **Melampyrum arvense** L. Felder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
663. — *nemorosum* L. Waldsäume und Hecken, z. B. Abhänge bei Mariaeinsiedl. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.
664. — *sylvaticum* L. Wälder. $\beta^4 \alpha^5 \dagger$.
665. **Pedicularis palustris** L. Auen, nasse Wiesen und Moore. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
666. — *Sceptrum Carolinum* L. Dachauermoos und feuchte Stellen der Isarauen. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.
667. **Rhinanthus minor** Ehrh. Wiesen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 γ . *angustifolius* Koch. Garchingerhaide: S.
668. — *major* Ehrh. Wiesen und Aecker. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
669. — *Alectorolophus* Poll. Aecker und Wiesen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
670. — *alpinus* Baumg. Garchingerhaide bis Milbertshofen. $\beta \alpha^5 \dagger$.
671. **Bartsia alpina** L. Dachauer- und Deiningermoor. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.
672. **Euphrasia officinalis** L. Wiesen, Haiden, Auen und Wälder. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
 γ . *nemorosa* Pers. mit der Stammform.
673. — *salisburgensis* Funk. Isarabhänge und Isarauen; Garchingerhaide: S., K. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.
674. — *Odontites* L. Felder, feuchte Wiesen, in Dörfern, Moore. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

LXX. Ordnung: *Labiatae* Juss.

675. **Mentha sylvestris** L. Ufer und sonstige feuchte Plätze. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 γ . *pubescens* Koch. Mit der Stammform.

676. **Mentha aquatica** L. An Gräben, Ufern und Quellen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 β . *hirsuta* L. und
 γ . *glabrata* Koch. Mit der Stammart.
677. — *sativa* L. Bei Moosach: B. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
678. — *arvensis* L. Felder. $\beta^5 \alpha^5$.
 β . *glabriuscula* Koch. Deiningermoor: B.
679. **Lycopus europaeus** L. Auen, Ufer, feuchte Triften. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
680. **Salvia glutinosa** L. Isarauen. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.
681. — *pratensis* L. Wiesen und Haiden. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 β . *variegata* Kitt. Freimann: K.
682. — *verticillata* L. Felder und Wegränder. $\beta^4 \alpha^3$.
683. **Origanum vulgare** L. Wälder, Auen und Hecken. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
684. **Thymus Serpyllum** L. Wiesen, Haiden und Auen. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
685. **Calamintha Acinos** Clairv. Felder und Auen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
686. — *alpina* Lam. Garchingerhaide; Isarkies; Abhänge bei Biederstein. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
687. **Clinopodium vulgare** L. Wälder und Felder. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$
688. **Nepeta Cataria** L. Auf Schutt, an Wegrändern z. B. bei Schwabing und Menterschwaige: S.; Neuhausen und Marsfeld: B., Hartmannshofen und Sendling: P.; Schleissheim: E. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.
689. **Dracocephalum Ruyschiana** L. Garchingerhaide: M., P. $\beta \alpha^2$.

690. **Glechoma** *hederacea* L. Felder, Zäune und Hecken. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
691. **Melittis** *Melissophyllum* L. In der Leite bei Heselohe und Pullach: S. $\beta. \alpha$.
692. **Lamium** *amplexicaule* L. Felder. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
693. — *purpureum* L. Auf Schutt, an Zäunen, um Mauern, in Gärten und Aeckern. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
694. — *maculatum* L. Waldränder, Wege. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
695. — *album* L. Wege, Schutt, fette Wiesen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
696. **Galeobdolon** *luteum* Huds. Waldränder und Auen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
697. **Galeopsis** *Ladanum* L. Felder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
 δ . *angustifolia* Hoffm. Mit der Stammform.
698. — *Tetrahit* L. Auf Schutt, Aeckern, Wegen. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
699. — *bifida* Bönningh. An den Rändern der Singstrasse: B. $\beta. \alpha$.
700. — *versicolor* Curt. Felder und Waldschläge. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
701. — *pubescens* Bess. Felder, in Dörfern. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
702. **Stachys** *germanica* L. Felder z. B. Grünwald, Geiseltasteig, Fröttmaning, Schleissheim. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
703. — *sylvatica* L. Wälder, Auen und Hecken. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
704. — *palustris* L. An Ufern und Gräben; Felder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
705. — *recta* L. Strassengräben, sonnige Hügel und Felder. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
706. **Betonica** *officinalis* L. Wälder, Wiesen, Heiden und Moore. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.

707. **Ballota nigra** L. Auf Schutt, an Wegen und Zäunen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
 β . *foetida* Koch. Mit der Stammform.
708. **Leonurus Cardiaca** L. An Zäunen in Unterschleissheim: E. $\beta \alpha^2 \dagger$.
709. **Scutellaria galericulata** L. Auf sumpfigen Wiesen, an Gräben und Ufern, in Mooren. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
710. **Prunella vulgaris** L. Wiesen, Auen und Moore. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
711. — *grandiflora* Jacq. Wiesen, Haiden und Auen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
712. **Ajuga reptans** L. Wiesen und Moore. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
713. — *genevensis* L. Felder und Haiden. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
714. — *Chamaepitys* Schreb. Brachfelder bei Garching: S. $\beta \alpha^2 \dagger$.
715. **Teucrium Botrys** L. Felder z. B. Garching und Moosach. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
716. — *Chamaedrys* L. Auen, Triften und Haiden. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
717. — *montanum* L. Auen und Haiden. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.

LXXI. Ordnung: *Verbenaceae* Juss.

718. **Verbena officinalis** L. Wegränder, Schutt. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.

LXXII. Ordnung: *Lentibularieae* Rich.

719. **Pinguicula alpina** L. Dachauer- und Deiningermoor; Isarauen. $\beta^2 \alpha^5 \dagger$.
720. — *vulgaris* L. Feuchte Wiesen und Moore. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

β. minor Koch. bei Lohhausen: B.

γ. grandiflora Lam. Deining: K.

721. **Utricularia vulgaris** L. Kanäle, Altwässer, Moore. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.

722. — *intermedia* Hayne. Dachauermoos. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.

723. — *minor* L. Stehende Wässer und Moore. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$. 6

LXXIII. Ordnung: *Primulaceae* DC.

724. **Lysimachia thyrsiflora** L. In Mooren, Sümpfen und Gräben z. B. Deininger- und Dachauermoor, bei Nymphenburg und Pasing. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

725. — *vulgaris* L. Auen, Abhänge und Büsche. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.

726. — *Nummularia* L. Feuchte Wiesen und Haine. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.

727. — *nemorum* L. Wälder und Büsche. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

728. **Anagallis arvensis** L. Felder und Auen. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.

729. — *coerulea* Schreb. Auf Aeckern bei Schwabing und Feldmoching: P. $\beta \alpha^2 \dagger$.

730. **Centunculus minimus** L. Nördliche Hügelreihe: Zuccarini, E. $\beta \alpha$.

731. **Primula farinosa** L. Moore und Auen. $\beta^4 \alpha^5 \dagger$.

732. — *acaulis* Jacq. Grünwald am Rand des Sauparks: S. $\beta \alpha \dagger$. 43

733. — *elatior* Jacq. Wiesen und Wälder. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

734. — *officinalis* Jacq. Wiesen und Wälder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

735. — *Auricula* L. Dachauermoos; Grünwald an Nagelfluefelsen: S. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.

LXXIV. Ordnung: *Globularieae* DC.

736. **Globularia** *vulgaris* L. Auen und Haiden.
 $\beta^2 \alpha^4 \dagger$. §
737. — *cordifolia* L. Haiden und Auen. $\beta^3 \alpha^5 \dagger$. §

LXXV. Ordnung: *Plantagineae* Juss.

738. **Plantago** *major* L. Felder und Triften. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
var. minima DC. Schleissheimermoor: K.
739. — *media* L. Felder und Triften. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
740. — *lanceolata* L. Wiesen, Haiden und Moore.
 $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
capitellata Koch. Garchingerhaide; Dachauer-
moor und Isarauen.

IV. Unterklasse: **Monochlamideae.**LXXVI. Ordnung: *Amaranthaceae* Juss.

741. **Amaranthus** *Blitum* L. Im Schleissheimer
Hofgarten. $\beta \alpha^4 \dagger$.
742. — *retroflexus* L. Auf Schutt bei Mariaeinsiedl:
P. Einmal und nicht wieder gefunden.

LXXVII. Ordnung: *Chenopodeae* Vent.

743. **Polycnemum** *arvense* L. Nur einmal bei der
Turnschule gefunden: S.
744. — *majus* Al. Braun. In einer Kiesgrube bei
Schleissheim: E. $\beta \alpha^3 \dagger$.
745. **Chenopodium** *hybridum* L. Schutthaufen,
Gärten. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

746. **Chenopodium polyspermum** L. Schutt, Wegränder, Gärten. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
747. — **album** L. Aecker, Auen, Gärten. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 α . **spicatum** Koch. Auf magerem Boden.
 β . **cymigerum** Koch. Auf fetterem Boden.
748. — **vulvaria** L. Sophienstrasse; hinter der Kirchhofmauer am Kapuzinerkloster: S.; an Zäunen bei Sendling: H. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.
749. **Blitum capitatum** L. An Zäunen in der Müllerstrasse und beim Krankenhaus: K. $\beta \alpha^2 \dagger$.
750. — **virgatum** L. Im Akademiehof: Gemminger. $\beta \alpha^2 \dagger$.
751. — **Bonus Henricus** C. Meyer. Auf Schutt, an Wegrändern; in Dörfern. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
752. — **glaucum** Koch. An ähnlichen Standorten. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
753. **Atriplex patula** L. An Wegrändern und auf Schutt. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.

LXXVIII. Ordnung: *Polygoneae* Juss.

754. **Rumex conglomeratus** Murr. Ufer und Gräben. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
755. — **sanguineus** L. Am Kanal zwischen Garching und Aumeister: S.; an feuchten Abhängen bei Maria-Einsiedl und Pullach: P. $\beta^2 \alpha^2 \dagger$.
756. — **obtusifolius** L. Wiesen und Gräben. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 β . **discolor** Wallr. unter der Stammform.
 γ . **sylvestris** Koch. Hartmannshofen: P.

757. **Rumex pratensis** Mert. et Koch. Am Kanal vom Aumeister nach Garching: S. $\beta \times$.
758. — *crispus* L. Auf Wiesen und an Wegen. $\beta^5 \times^3 \dagger$.
759. — *Hydrolapathum* Hud. In den Altwässern der Amper bei Unterbruck: E. $\beta \times^3 \dagger$.
760. — *aquaticus* L. An Kanälen z. B. Schleissheim, Nymphenburg, Freimann. $\beta^3 \times^4 \dagger$.
761. — *Acetosa* L. Felder und Morre. $\beta^4 \times^5 \dagger$.
 β . *auriculatus* Koch. unter der Stammform.
762. — *Acetosella* L. Felder, Auen und Moore. $\beta^4 \times^5 \dagger$.
 β . *angustifolius* Koch. Isarkies.
763. **Polygonum Bistorta** L. Dachauermoos. $\beta^2 \times^4 \dagger$.
764. — *viviparum* L. In den Isarauen; auf der Garchingerhaide; im Dachauermoos; in der Hirschau und im Perlacherforst. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
765. — *amphibium* L.
 α . *natans* Mönch. In Kanälen, Teichen, Altwässern und Seen;
 β . *terrestre* Leers. Auf feuchten Wiesen und Ufern, besonders häufig um Schleissheim.
 $\beta^3 \times^4 \dagger$.
766. — *lapathifolium* L. Gräben, Moore. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
 β . *incanum* Schmidt. Moosach: P.; Heimhausen und Schleissheim: K.
767. — *Persicaria* L. Aecker, Gräben, Ufer und Wege.
 $\beta^5 \times^5 \dagger$.
768. — *Hydropiper* L. Gräben und Aecker um Feldmoching, Schleissheim, Heimhausen: P. $\beta^2 \times^3 \dagger$.
769. — *mite* Schrank. Moore, Ufer, Pfützen. $\beta^3 \times^4 \dagger$.

770. **Polygonum minus** Huds. In einem Wassergraben bei Lohhof: P. β α .
771. — **aviculare** L. Wegränder, Felder und Auen. β^5 α^5 †.
772. — **Convolvulus** L. Felder. β^5 α^4 †.
773. — **dumetorum** L. Auf Neubrüchen in der äusseren Theresienstrasse: S. Nicht wieder gefunden.

LXXIX. Ordnung: *Thymeleae* Juss.

774. **Passerina annua** Wickstr. In den Isarauen nur einmal gefunden: M.
775. **Daphne Mezereum** L. Wälder, Auen und Büsche. β^5 α^3 †.
776. — **Cneorum** L. Haiden, Auen und Abhänge. β^4 α^4 †.

LXXX. Ordnung: *Santalaceae* Rob. Br.

777. **Thesium montanum** Ehrh. Isarabhänge. β^2 α^3 †.
778. — **intermedium** Schrad. Garchingerhaide bis Milbertshofen und Freimann. β^3 α^4 †.
779. — **pratense** Ehrh. Isarauen; auf Wiesen bei Pasing und Leutstetten. β^3 α^4 †.
780. — **alpinum** L. Kies und Abhänge der Isar. β^2 α^3 †.
781. — **rostratum** Koch. Isarauen; um Ismaning: P.; Schwarzhölzl am Dachauermoos: P., K. β^2 α^5 †.

LXXXI. Ordnung: *Eleagneae* R. Br.

782. **Hippophaë rhamnoides** L. Isarauen, Amperauen; im Dachauermoor: P. β^2 α^5 †.

LXXXII. Ordnung: *Aristolochiaceae* Juss.

783. **Asarum europaeum** L. Büsche und Wälder.
 $\beta^4 \kappa^3 \dagger$.

LXXXIII. Ordnung: *Euphorbiaceae* Juss.

784. **Euphorbia helioscopia** L. Felder, Gärten und Auen. $\beta^5 \kappa^3 \dagger$.
 785. — *stricta* L. Auen und Wege z. B. Grünwald, Hirschau. $\beta^3 \kappa^3 \dagger$.
 786. — *dulcis* L. In den Wäldern des Isarthals; in Hainen bei Schleissheim. $\beta^3 \kappa^3 \dagger$.
 787. — *verrucosa* Lam. Auen, Haiden und Wiesen. $\beta^3 \kappa^4 \dagger$.
 788. — *Cyparissias* L. Felder und Auen. $\beta^5 \kappa^5 \dagger$.
 789. — *Esula* L. Bei Moosach und Hartmannshofen auf Feldrainen: P. $\beta \kappa^2 \dagger$.
 790. — *Peplus* L. Aecker und Gärten. $\beta^5 \kappa^4 \dagger$.
 791. — *exigua* L. Auf Aeckern der Garchingerhaide; bei Föhring: P.; Starnberg: Einsele. $\beta^3 \kappa^4 \dagger$.
 792. **Mercurialis perennis** L. Wälder im Isarthal. $\beta^2 \kappa^4 \dagger$.
 793. — *annua* L. Gärten, Schutt, Wegränder. $\beta^4 \kappa^3 \dagger$.

LXXXIV. Ordnung: *Urticaceae* Juss.

794. **Urtica urens** L. Gärten, Felder, Wege, Schutt. $\beta^5 \kappa^3 \dagger$.
 795. — *dioica* L. Wege, Büsche. $\beta^5 \kappa^4 \dagger$.
 796. **Humulus Lupulus** L. Auen und Hecken. $\beta^4 \kappa^3 \dagger$.
 797. **Ulmus campestris** L. Auen und Wälder. $\beta^5 \kappa^2 \dagger$.

LXXXV. Ordnung: *Cupuliferae* Rich.

798. **Fagus sylvatica** L. Wälder. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
 799. **Quercus pedunculata** Ehrh. Wälder. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 800. **Corylus Avellana** L. Wälder und Hecken.
 $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
 801. **Carpinus Betulus** L. Wälder. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.

LXXXVI. Ordnung: *Salicineae* Rich.

802. **Salix fragilis** L. Isarauen. $\beta \alpha^2 \dagger$.
 803. — *alba* L. Auen und Ufer. $\beta^4 \alpha^5 \dagger$.
 β . *vitellina* Koch. Isarauen.
 804. — *amygdalina* L. Auen. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
 805. — *daphnoides* Vill. Auen und Hecken. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
 806. — *purpurea* L. Auen, Wälder, Ufer, Büsche.
 $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
 807. — *viminalis* L. Bei Leoni am Starnbergersee: S.
 $\beta \alpha^2 \dagger$.
 808. — *acuminata* Sm. Am Ufer des Starnbergersees
bei Leoni: S. $\beta \alpha \dagger$.
 809. — *incana* Schrank. Auen, Ufer, Büsche. $\beta^4 \alpha^5 \dagger$.
 810. — *cinerea* L. Büsche, Auen, Abhänge. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
var. androgyna. Isarauen beim Freibade.
 811. — *nigricans* Fries. Ufer, Auen, Büsche. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
var. eriocarpa: Mariaeinsiedl: M.
 812. — *grandifolia* Ser. Abhänge der Isar bei der
Menterschwaige: S. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
 813. — *Caprea* L. Auen, Abhänge, Wälder und Büsche.
 $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.

814. **Salix aurita** L. Deininger-, Dachauer- und Erdingermoor. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
815. — *myrtilloides* L. Deiningermoor. $\beta \times^3 \dagger$.
816. — *repens* L. Moore. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
 α . *vulgaris* Koch und
 γ . *argentea* Sm. mit der Stammform.
817. — *incano-caprea* (Seringeana Gaud.) Im Hofgarten zu Schleissheim; wird nach der Versicherung des Herrn Controleurs Eisenbarth dort nicht cultivirt, wohl aber die Stammarten. $\beta \times \dagger$.
818. — *aurita-myrtilloides* (finmarchica Fries.) Deiningermoor: S. B. P. M. H. $\beta \times^2 \dagger$.
819. — *myrtilloidi-aurita*. Deiningermoos: S. B. P. M. H. $\beta \times^2 \dagger$.
820. — *myrtilloidi-repens* (depressa L.) Mit voriger. $\beta \times^2 \dagger$.
821. — *repenti-myrtilloides*. Unter voriger. $\beta \times \dagger$.
822. — *repenti-aurita* (ambigua Ehrh.) Ebendort. $\beta \times^2 \dagger$.
823. — *aurita-repens*. Deininger- und Dachauermoos: E. $\beta^2 \times^3 \dagger$.
824. **Populus tremula** L. Wälder und Auen. $\beta^5 \times^3 \dagger$.
825. — *nigra* L. Auen. $\beta^4 \times^3 \dagger$.

LXXXVII. Ordnung: *Betulineae* Rich.

826. **Betula alba** L. Auen und Wälder. $\beta^4 \times^5 \dagger$.
827. — *pubescens* Ehrh. Menterschwaige am Abhang; Dachauer- und Deiningermoor. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
828. — *humilis* Schrank. Deininger- und Dachauermoos. $\beta^2 \times^5 \dagger$.

829. **Alnus incana** DC. Auen, Büsche und Wälder.
 $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
830. — **glutinosa** DC. Würm- und Ampergebiet. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

LXXXVIII. Ordnung: *Coniferae* Juss.

831. **Juniperus communis** L. Wälder, Auen und Haiden; in der Hirschau, bei Grünwald und Dachau schöne baumartige Exemplare. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
832. **Pinus sylvestris** L. Wälder, Moore und Haiden.
 $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
833. — **Pumilio** Hänke. Deiningermoor. $\beta \alpha^4 \dagger$.
834. — **Abies** L. Wälder. $\beta^5 \alpha^5$.
835. — **Larix** L. Bei Harlaching und Bruck. $\beta \alpha^2 \dagger$.
836. — **Picea** L. Nördliche Hügelreihe. $\beta \alpha^3 \dagger$.

II. Classe:

Monocotyledoneae.

LXXXIX. Ordnung: *Hydrocharideae* DC.

- Stratiotes aloides** L. Im Pilsensee bei Seefeld:
 Schonger. $\beta \alpha^2 \dagger$. 5
837. **Hydrocharis Morsus ranae** L. In den Alt-
 wässern der Amper bei Dachau: Ohmüller. $\beta \alpha^3 \dagger$. 7

XC. Ordnung: *Alismaceae* Juss.

838. **Alisma** *Plantago* L. Stehende Wässer und Moore. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.

β . lanceolatum Koch. Isarauen: K.

XCI. Ordnung: *Butomeae* Juss.

839. **Butomus** *umbellatus* L. Stehende und langsam fließende Wässer z. B. Schleissheim, Aubing, im Nymphenburger Canal, Allach. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

XCII. Ordnung: *Juncagineae* Juss.

840. **Scheuchzeria** *palustris* L. Deiningermoor. $\beta \alpha^3 \dagger$.

841. **Triglochin** *palustre* L. Moore; feuchte Ufer bei Freimann. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

XCIII. Ordnung: *Potameae* Juss.

842. **Potamogeton** *natans* L. Canäle und Altwasser. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

843. — *rufescens* Schrad. Deiningermoos: P. $\beta \alpha^3 \dagger$.

844. — *gramineus* L. Schleissheimermoor am Weiherl: S.; bei Dachau, im Deiningermoos: P. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.

845. — *lucens* L. Bäche bei Ismaning: P.; in den Isarauen: H.; in der Würm bei Starnberg: Einsele. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.

846. — *perfoliatus* L. Canäle, Bäche und Teiche. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

847. — *crispus* L. Canäle, Bäche und Seen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

848. — *acutifolius* Link. Bei Dachau: Ohlmüller. $\beta \alpha$.

849. **Potamogeton pusillus** L. Teiche, Bäche und Canäle. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
850. — *pectinatus* L. Wie voriger. $\beta^4 \alpha^4$.
851. — *densus* L. Wie voriger. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 β . *lancifolius* Koch. In den Canälen bei Gar-
ching: P., Forellenbach bei Haching: K.
852. **Zanichellia palustris** L. In den Isarcanälen; in einem Teich bei Harlaching: H.; im Quellbach zwischen Hirschau und Freimann: S., im Weiher von Mariaeinsiedl: C. Schimper, im Hachinger Forellenbach: K. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.

XCIV. Ordnung: *Lemnaceae* Link.

853. **Lemna trisulca** L. In Wässern und Pfützen z. B. im Quellbach bei Brunnthal: S., in den Föhringerauen: P. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
854. — *polyrrhiza* L. In einem Bache bei Lohhausen: K. $\beta \alpha^2$.
855. — *minor* L. Stehende Wässer und Gräben. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
856. — *gibba* L. Sandgrube neben dem grossen Wirth in Schwabing: Kurz. $\beta \alpha^3 \dagger$.

XCV. Ordnung: *Typhaceae* Juss.

857. **Typha latifolia** L. Dachauer- und Erdinger-
moos. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
858. **Sparganium ramosum** Huds. Moore, Gräben und Ufer. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

859. **Sparganium simplex** Huds. Im Schleissheimermoos: H. $\beta \times^3 \dagger$.

860. — *natans* Huds. Moore und Gräben. $\beta^3 \times^3 \dagger$.

XCVI. Ordnung: *Aroideae* Juss.

861. **Arum maculatum** L. Im englischen Garten, Menzinger Lohe und Deisenhofer Thal. $\beta^3 \times^3 \dagger$.

862. **Acorus Calamus** L. An Canälen z. B. bei Nymphenburg und Schleissheim; am Ufer der Isar bei Pullach und der Amper bei Bruck; im Dachauermoos. $\beta^3 \times^4 \dagger$.

XCVII. Ordnung: *Orchideae* Juss.

863. **Orchis militaris** L. Auf Auen und Wiesen. $\beta^3 \times^3 \dagger$.

864. — *ustulata* L. Haidewiesen z. B. Garching, Freimann, bei Moosach. $\beta^3 \times^2 \dagger$.

865. — *coriophora* L. Haiden und Auen z. B. Neuherberg, Freimann, Föhring, Perlach. $\beta^3 \times^3 \dagger$.

866. — *Morio* L. Haiden, Moore und Wiesen. $\beta^5 \times^4 \dagger$.

867. — *mascula* L. Auf der Wiese unter Grünwald: S.; im Allacher Lohe: Radelkofer. $\beta \times^2 \dagger$.

868. — *laxiflora* Lam. Moosach und Schleissheim im Dachauermoor; Maisteig an der nördlichen Hügelreihe. $\beta^2 \times^2 \dagger$.

869. — *maculata* L. Isarauen, Moosach. $\beta^2 \times^2 \dagger$.

870. — *latifolia* L. Feuchte Wiesen und Moore. $\beta^4 \times^3 \dagger$.

871. — *incarnata* L. Moore und feuchte Wiesen. $\beta^3 \times^3 \dagger$.

β. lanceolata Rehb. Deininger- und Dachauer-
moos.

872. **Orchis Traunsteineri** Saut. Deiningermoos: M.,
H., P. $\beta \times^3 \dagger$. 5

873. **Anacamptis pyramidalis** Rich. Auf der Haide
bei Neuherberg: P., B. $\beta \times^2 \dagger$. 5 - 7

874. **Gymnadenia conopsea** R. Br. Haiden, Auen
und Wiesen. $\beta^4 \times^4 \dagger$. 5 - 8

β. ornithis Jacq. Isarauen: K.

875. — *odoratissima* Rich. An den Abhängen der
Menterschwaige; auf der Freimannerhaide: P.
 $\beta^2 \times^3 \dagger$. 6

876. **Platanthera bifolia** Rich. Haiden, Wiesen,
Wälder und Moore. $\beta^4 \times^3 \dagger$. 6

877. — *chlorantha* Cust. Haidwiesen bei Ismaning und
Auen bei Unterföhring, Hirschau: P., Freimann:
E. $\beta^2 \times^2 \dagger$. 5 - 7

878. **Ophrys muscifera** Huds. Isarauen. $\beta^2 \times^3 \dagger$. 5

879. — *aranifera* Huds. Haidewiesen bei Freimann;
Aufkirchen am Starnbergersee: v. Spitzl; Isar-
auen bei Schäftlarn: K. $\beta^2 \times^2 \dagger$. 4

880. — *Arachnites* Reich. In den Isarauen an mehreren
Plätzen; bei Freimann mit voriger; um Starnberg:
Einsele. $\beta^2 \times^2 \dagger$. 6

881. **Herminium Monorchis** R. Br. Isarauen. $\beta \times^4 \dagger$.

882. **Epipogium Gmelini** Rich. Im Grünwalder Forst:
Pirngruber. $\beta \times$.

883. **Cephalanthera pallens** Rich. In Wäldern.
 $\beta^4 \times^2 \dagger$. 5 - 7

884. **Cephalanthera ensifolia** Rich. Isarauen und zwischen Starnberg und Leutstetten: S. $\beta \times^2$. 5
885. — *rubra* Rich. An bewaldeten Abhängen bei Heselohe, Deining, Gauting; Starnberg: Einsele. $\beta^3 \times^2 \dagger$. 5
886. **Epipactis latifolia** All. Wälder. $\beta^4 \times^3 \dagger$. 6
887. — *rubiginosa* Gaud. Abhänge der Isar. $\beta \times^3 \dagger$. 5
888. — *palustris* Crantz. Auen, feuchte Wiesen und Moore. $\beta^3 \times^3 \dagger$. 6
889. **Listera ovata** Br. Wälder und Auen. $\beta^3 \times^2 \dagger$. 5
890. **Neottia Nidus avis** Rich. Wälder des Isarthals. $\beta^2 \times^2 \dagger$. 5
891. **Goodyera repens** R. Br. Wälder bei Neuherberg: S.; nördliche Hügelreihe: E.; Schwarzhölzl am Dachauermoos: H.; Starnberg: K. $\beta^2 \times^2 \dagger$. 4
892. **Spiranthes autumnalis** Rich. Im Moos bei Leutstetten: Walther. $\beta \times^2$. 8
893. **Corallorrhiza innata** R. Br. Im Laubwald bei Geiseltasteig. $\beta \times \dagger$. 5
894. **Sturmia Loeselii** Rchb. Schleissheim am Weiherl: S. $\beta \times$. 6
895. **Malaxis paludosa** Sw. Deiningermoor. $\beta \times^2 \dagger$. 7
896. **Microstylis monophyllos** Lindl. An den Abhängen der Isar bei Geiseltasteig: P.; am Rande des Starnbergersees: K. $\beta \times \dagger$. 6
897. **Cypripedium Calceolus** L. An den Isarabhängen; in den Isarauen: K.; Starnberg. $\beta^2 \times^2 \dagger$. 5

XCVIII. Ordnung: *Irideae* Juss.

898. **Gladiolus palustris** Gaud. Auf der Garchingerhaide: P.; Schwarzhölzl am Dachauermoos: Schultes. $\beta^2 \times^4 \dagger$.

899. **Iris variegata** L. Am Saume des Kapuzinerhölzl: v. Pechmann; in Hecken auf der Garchingerhaide gegen Unterschleissheim und Eching: E. $\beta^2 \times^2 \dagger$. 5

900. — **Pseud-Acorus** L. Gräben, Sümpfe und Moore. $\beta^4 \times^3 \dagger$. 6

901. — **sibirica** L. An Gräben bei Moosach im Moor. $\beta \times^3 \dagger$. 7

— **germanica** L. Im Dachauermoos verwildert: P., K.

XCIX. Ordnung: *Amaryllideae* R. Br.

Narcissus poëticus L. Ehedem bei Harlaching: S.

— **Pseudo-Narcissus** L. Mit vorigem; beide in neuerer Zeit nicht wieder gefunden.

902. **Leucojum vernum** L. In der Hirschau; Ebenhausen; Schäftlarn; Starnberg auf Wiesen. $\beta^3 \times^3 \dagger$. 3

903. **Galanthus nivalis** L. In den Remisen bei der Georgenschwaige und Schleissheim, bei Brunnthal, Pasing und Olching. $\beta^3 \times^3 \dagger$.

C. Ordnung: *Asparageae* Juss.

904. **Asparagus officinalis** L. In den Isarauen; bei Schleissheim an Ufern und Mauern verwildert. $\beta \times \dagger$.

905. **Paris quadrifolia** L. Laubwälder z. B. englischer Garten, Menzinger- und Echingerlohe, Deisenhoferthal. $\beta^3 \times^3 \dagger$. 5

906. **Convallaria verticillata** L. Zwischen Deining und der Isar im Wald. $\beta \times^3 \dagger$.
907. — **Polygonatum** L. Wälder und Haiden. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
908. — **multiflora** L. In Gebüsch und Wäldern. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
909. — **majalis** L. Laubwälder. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
910. **Majanthemum bifolium** DC. Wälder. $\beta^4 \times^4 \dagger$.

Cl. Ordnung: *Liliaceae* DC.

911. **Lilium Martagon** L. Laubwälder und Gebüsch z. B. im Isarthal, Hartmannshofen, Menzingerlohe, Starnberg, nördliche Hügelreihe. $\beta^4 \times^2 \dagger$.
912. **Anthericum Liliago** L. In Laubwäldern bei Grünwald und Hartmannshofen. $\beta^2 \times^3 \dagger$.
913. — **ramosum** L. Abhänge, Haideflächen. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
914. **Ornithogalum umbellatum** L. In den Hofgärten zu München, Dachau und Schleissheim. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
915. — **nutans** L. Bei Harlaching und in Dachau: S. $\beta \times$.
916. **Gagea arvensis** Schult. Laim: Ohmüller. $\beta \times^2$.
917. — **lutea** Schult. Auen, Abhänge und Hecken. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
918. **Scilla amoena** L. Auf der Wiese ober dem Lettinger und bei Mariaeinsiedl: S. $\beta \times$.
919. **Allium ursinum** L. Im englischen Garten um den See. $\beta \times^2 \dagger$.
920. — **fallax** Don. An den Abhängen ober der Menter-schwaige. $\beta \times^2 \dagger$.

921. **Allium suaveolens** Jacq. Dachauermoor: v. Spitzl; Isarauen bei Fröttmaning: P.; Schäftlarn: H. $\beta^3 \kappa^3 \dagger$.
922. — **vineale** L. In Feldern um Dachau: Ohmüller. $\beta \kappa^2$.
923. — **oleraceum** L. Waldränder und Hecken z. B. bei Mariaeinsiedl, Nymphenburg, Eching, nördliche Hügelreihe. $\beta^3 \kappa^3 \dagger$.
924. — **carinatum** L. Haide- und Moorwiesen, Gebüsche. $\beta^4 \kappa^3 \dagger$.
925. — **Schoenoprasum** L. Am Dachauermoos gegen Feldmoching: K. $\beta \kappa^2 \dagger$.
926. **Hemerocallis flava** L. In der Hirschau bei Biederstein: Zuccarini. $\beta \kappa^2 \dagger$.
— **fulva** L. Ober dem Kloster Schäftlarn: S. und an den Canälen bei Schleissheim verwildert.
927. **Muscari botryoides** Mill. Auf einer Wiese um die Reismühle bei Gauting und bei Königswiesen. $\beta \kappa^5 \dagger$. 4

CII. Ordnung: *Colchicaceae* DC.

928. **Colchicum autumnale** L. Wiesen. $\beta^5 \kappa^5 \dagger$.
929. **Veratrum album** L. Um Schäftlarn am rechten Isarufer: Schonger. $\beta \kappa^2$.
 β . **Lobelianum** Koch. In einem Walde bei Starnberg: K.
930. **Tofieldia calyculata** Whlb. Wiesen, Haiden und Moore. $\beta^4 \kappa^4 \dagger$.

CIII. Ordnung: *Juncaceae* Bartl.

931. **Juncus conglomeratus** L. An feuchten Orten.
 $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
932. — *effusus* L. An Gräben und in Wäldern z. B.
 im Aubingerlohe: P. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
933. — *glaucus* Ehrh. Ufer, Gräben, Tümpeln. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
934. — *obtusiflorus* Ehrh. Moore und Gräben. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
935. — *sylvaticus* Rchb. Dachauermoos: S. $\beta \alpha^3 \dagger$.
936. — *lamprocarpus* Ehrh. Feuchte Orte. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 β . *fluitans* Koch. Deiningermoos: P.
937. — *alpinus* Vill. Isarauen. $\beta \alpha^4 \dagger$.
938. — *compressus* Jacq. Wege, Triften und Moore.
 $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
 β . *culmo teriti*. Dürnismaning: S.
939. — *bufonius* L. Wegränder, Aecker, Ufer, Auen,
 Moore. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
940. **Luzula pilosa** Willd. Wälder und Gebüsch.
 $\beta^4 \alpha^5 \dagger$.
941. — *albida* DC. Wälder. $\beta^4 \alpha^5 \dagger$.
 β . *rubella* Koch. In den Wäldern von Grün-
 wald und Deining.
942. — *campestris* DC. Wiesen und Haiden. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
943. — *multiflora* Lej. Wälder. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
944. — *flavescens* Gaud. Um Dingharding: B. $\beta \alpha^3$.

CIV. Ordnung: *Cyperaceae* Juss.

945. **Cyperus flavescens** L. Deininger- und Dachauer-
 moos; bei Freimann: P. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

946. **Cyperus fuscus** L. Wie voriger. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
 β . *virens* Hoffm. Maisteig an der nördlichen
Hügelreihe: K.
947. **Schoenus nigricans** L. Auen und Moore.
 $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
948. — *ferrugineus* L. Wie voriger. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
949. **Cladium Mariscus** R. Br. Dachauer- und Er-
dingermooß; zwischen Starnberg und Leustetten:
S. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
950. **Rhynchospora alba** Vahl. Moore. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
951. **Heleocharis palustris** R. Br. Gräben, Pfützen,
Auen und Moore. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
952. — *uniglumis* Link. An ähnlichen Standorten wie
vorige. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
953. — *ovata* R. Br. Wassergräben und Pfützen bei
Biederstein und Moosach: Zuccarini. $\beta^2 \alpha^2$.
954. — *acicularis* R. Br. In den Isarauen bei Föhring
und Freimann: P. $\beta^2 \alpha^3$.
955. **Scirpus caespitosus** L. Moore. $\beta^4 \alpha^4$.
956. — *pauciflorus* Ligh. Moore. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
957. — *setaceus* L. Dachauermoor. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.
958. — *lacustris* L. Würmsee und Moore. $\beta^4 \alpha^5 \dagger$.
959. — *maritimus* L. Starnberg, an den Badeplätzen
am See: H. $\beta \alpha^2 \dagger$.
960. — *sylvaticus* L. Ufer. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
961. — *compressus* Pers. Nasse Orte. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
962. **Eriophorum alpinum** L. Dachauer- und Dei-
ningermoor. $\beta^3 \alpha^5 \dagger$.
963. — *vaginatum* L. Moore. $\beta^4 \alpha^5 \dagger$.

964. **Eriophorum** *latifolium* Hop. Moore. $\beta^4 \alpha^5 \dagger$.
965. — *angustifolium* Roth. Moore. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
966. — *gracile* Koch. Schleissheimermoor: S., Deininger-
moor: P. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
967. **Carex** *dioica* L. Moore. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
968. — *Davalliana* Sm. Feuchte Wiesen und Auen,
Moore. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 β . *Sieberiana* Opitz: Moosach: M.
969. — *capitata* L. Deiningermoos: Zuccarini; Starn-
berg: S. $\beta \alpha^5 \dagger$.
970. — *pulicaris* L. Dachauermoos: S. $\beta^2 \alpha^3$.
971. — *pauciflora* Lighth. Deiningermoos. $\beta \alpha^5 \dagger$.
972. — *microglochin* Wahlenb. Aufkirchen am Würm-
see: Zuccarini; Deiningermoor: M. $\beta \alpha^2 \dagger$.
973. — *chordorrhiza* Ehrh. Deiningermoos. $\beta \alpha^4 \dagger$.
974. — *disticha* Huds. Moore und feuchte Wiesen z. B.
bei Biederstein und Freimann: $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
975. — *vulpina* L. Nasse Wiesen z. B. bei Deining
und Moosach. $\beta^3 \alpha^2 \dagger$.
976. — *muricata* L. Wälder, Auen, Abhänge. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
 β . *virens* Koch. Isarauen, Hirschau.
977. — *teretiuscula* Good. Moore. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
978. — *paniculata* L. Moore, feuchte Wiesen und
Auen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
979. — *paradoxa* Willd. Deininger- und Dachauer-
moos; auf feuchten Wiesen bei Mariaeinsiedl: H.,
der Georgenschwaige: P. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
980. — *brizoides* L. Wälder, Hecken z. B. bei Dei-
ning, Ebenhausen, Gauting. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

981. **Carex remota** L. Schattige Wälder z. B. bei Grünwald, Deining. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
982. — *stellulata* Good. Moore und Auen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
983. — *leporina* L. Wälder, Moore, Ufer, feuchte Wiesen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
984. — *elongata* L. Deiningermos: P., bei Türkenfeld: B. $\beta^2 \alpha^3$.
985. — *Heleonastes* Ehrh. Deiningersfilz. $\beta \alpha^3 \dagger$.
986. — *canescens* L. Deiningermoor. $\beta \alpha^3 \dagger$.
987. — *mucronata* All. Isarkies: M. $\beta \alpha$.
988. — *stricta* Good. Moore, Ufer und Sümpfe. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
989. — *vulgaris* Fries. An gleichen Orten. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
990. — *acuta* L. Wie vorige. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
991. — *Buxbaumii* Wahlb. Dachauermos und bei Türkenfeld. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.
992. — *limosa* L. Dachauer - und Deiningermos. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
993. — *pilulifera* L. Waldschläge z. B. bei Grünwald. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
994. — *tomentosa* L. Moore und feuchte Wiesen z. B. Freimann. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
995. — *montana* L. Haiden und Abhänge. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
996. — *ericetorum* Poll. Wälder, Wiesen, Haiden und Auen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
997. — *praecox* Jacq. Wälder, Wiesen, Auen und Haiden. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.

β . *umbrosa* Host. Moosach gegen die Fasanerie: S.; Isarauen, Menterschwaige: K.

998. **Carex polyrrhiza** Wallr. Dachauermoos; im Kapuzinerhölzl: P.; Isarauen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
999. — *humilis* Leyss. Garchingerhaide, Türkengraben, Isarauen. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
1000. — *digitata* L. Isarauen, Abhänge und Wälder. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
1001. — *ornithopoda* Willd. Isarauen, Isarabhänge. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
1002. — *alba* Scop. Auen und Laubwälder. $\beta^4 \alpha^5 \dagger$.
1003. — *panicea* L. Moore, Auen und Ufer. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
1004. — *glauca* Scop. Moore, Auen, Ufer, Wege, Gebüsch. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
1005. — *maxima* Scop. Abhänge bei Harlaching: Zuccarini; zwischen Heselohe und Pullach: K. $\beta \alpha \dagger$.
1006. — *pallesens* L. In Wäldern. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
1007. — *sempervirens* L. Isarauen bei der Menter-schwaige und bei Freimann; Abhänge an der Isar. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
1008. — *flava* L. Moore, Auen und Pfützen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
 β . *polystachya*. Isarauen: M.
1009. — *Oederi* Ehrh. Feuchte Wiesen und Auen. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
1010. — *fulva* Good. Moore und Auen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
1011. — *Hornschuchiana* Hop. Moore, Ufer, feuchte Wiesen und Auen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
1012. — *distans* L. Moore und feuchte Wiesen z. B. bei Biederstein, Freimann. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
1013. — *sylvatica* Huds. Wälder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.

1014. **Carex Pseudo-Cyperus** L. Um Starnberg am Meisingersee bei Pöcking: Schonger. $\beta \times^3$.
1015. — *ampullacea* Good. Moore, feuchte Wiesen, Ufer und Auen. $\beta^5 \times^4 \dagger$.
1016. — *vesicaria* L. An ähnlichen Standorten wie vorige. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
1017. — *paludosa* Good. Moore und Ufer. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
 β . *Kochiana* DC. Moosach: M.
1018. — *riparia* Curt. Amperufer bei Heimhausen: E. $\beta \times$.
1019. — *filiformis* L. Deininger- und Dachauermoos. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
1020. — *hirta* L. Auen, Wiesen und Wälder. $\beta^4 \times^4 \dagger$.

CV. Ordnung: *Gramineae* Juss.

1021. **Andropogon Ischaemum** L. Ober der schmerzhaften Kapelle: v. Spitzl. $\beta \times^2$.
1022. **Panicum glabrum** Gaud. Auf der nördlichen Hügelreihe: E.; auf Brachen der Garchingerhaide: K.; Schleissheim: P. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
1023. — *Crus galli* L. Um Schleissheim und auf der nördlichen Hügelreihe. $\beta^2 \times^2 \dagger$.
1024. **Setaria viridis** Beauv. Auf Feldern. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
1025. — *glauca* L. Auf Aeckern. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
1026. **Phalaris arundinacea** L. Ufer, Gräben und Auen. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
1027. **Hierochloa odorata** Wahlb. In den Isarauen. $\beta^2 \times^3 \dagger$.

1028. **Anthoxanthum odoratum** L. Auen und Wiesen. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.

1029. **Alopecurus pratensis** L. Wiesen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

1030. — **geniculatus** L. Türkenfeld: B.; Lohhausen: H.; Zamdorf: M. $\beta \alpha^2$.

1031. — **fulvus** Sm. Moore und feuchte Wiesen. $\beta^4 \alpha^4$.

1032. **Phleum Böhmeri** Wib. Trockene Wiesen und Haiden z. B. Neuherberg, Freimann, Unterföhring. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

1033. — **pratense** L. Wiesen und Aecker. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
 β . **nodosum** L. Auf trockenem Boden z. B. am Marsfeld: B.; in der Müllerstrasse: K.

1034. **Leersia oryzoides** Sw. Meisingersee bei Starnberg: Schonger; im Schwarzhölzl am Dachauer-moss: E. $\beta \alpha^2$.

1035. **Agrostis stolonifera** L. Auen, Isarkies, Felder. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.

β . **gigantea** Koch. Isarauen, Milbertshofen: P.

γ . **prorepens** Koch. Isarkies.

δ . **aristata**. Isarauen: P.

1036. — **vulgaris** With. Wiesen, Felder und Raine. $\beta^4 \alpha^5 \dagger$.

β . **pumila** L. Zwischen Geiseltasteig und Grünwald: S.

1037. — **canina** L. Wiesen. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.

1038. **Apera Spica venti** Beauv. Felder. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

1039. **Calamagrostis littorea** DC. Isarauen. $\beta^2 \alpha^4 \dagger$.

β . **pallida**. Isarauen.

1040. **Calamagrostis Epigeiois** Roth. Isarauen.
 $\beta^2 \times^4 \dagger$.
 β . *glauca* Rchb. Isarauen.
1041. — *montana* Host. Isarauen und Abhänge. $\beta^3 \times^4 \dagger$.
 β . *acutiflora* Koch. Mit der Stammform.
1042. — *sylvatica* DC. Perlacher Wald: Ohmüller;
Kapuzinerhölzl: P. $\beta^2 \times^3 \dagger$.
1043. **Milium effusum** L. In Laubwäldern. $\beta^3 \times^4 \dagger$.
1044. **Phragmites communis** Trin. Moore und Ufer.
 $\beta^5 \times^5 \dagger$.
 β . *picta* (foliis variegatis). Schwarzhölzl im
Dachauermoos: H.
1045. **Sesleria coerulea** Ard. Isarauen. $\beta^3 \times^5 \dagger$.
1046. **Koeleria cristata** Pers. Wiesen. $\beta^4 \times^5 \dagger$.
1047. **Aira caespitosa** L. Wiesen, Wälder und Ufer.
 $\beta^5 \times^5 \dagger$.
1048. **Holcus lanatus** L. Wiesen. $\beta^5 \times^5 \dagger$.
1049. — *mollis* L. In den Remisen hinter der Bavaria,
im Kapuzinerhölzl und in den Lohen. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
1050. **Arrhenaterum elatius** M. et Koch. Wiesen.
 $\beta^5 \times^5 \dagger$.
1051. **Avena pubescens** L. Wiesen. $\beta^5 \times^4 \dagger$.
1052. — *pratensis* L. Wiesen und Wälder. $\beta^3 \times^4 \dagger$.
1053. — *flavescens* L. Wiesen. $\beta^5 \times^5 \dagger$.
1054. — *fatua* L. Felder um Schleissheim: P. $\beta \times^4$.
1055. — *caryophyllea* Wigg. Neuherberg: Zuccarini;
nördliche Hügelreihe: E.
1056. **Triodia decumbens** Beauv. Haiden und Wälder.
 $\beta^4 \times^3 \dagger$.

1057. **Melica nutans** L. Auen, Büsche und Wälder.
 $\beta^5 \kappa^3 \dagger$.
1058. **Briza media** L. Wiesen und Auen. $\beta^5 \kappa^5 \dagger$.
1059. **Poa annua** L. Wiesen und Wege. $\beta^5 \kappa^5 \dagger$.
 β . *varia* Koch. Isarkies: K.
1060. — *minor* Gaud. Isarkies. $\beta \kappa^2 \dagger$.
1061. — *alpina* L. Isarkies. $\beta \kappa^4 \dagger$.
1062. — *nemoralis* L. Büsche und Wälder. $\beta^4 \kappa^4 \dagger$.
 γ . *glauca* Koch. Kapuzinerhölzl: S.
 δ . *firmula* Koch. Kaninchenberg bei Schleissheim.
1063. — *fertilis* Host. Bei Biederstein: Ohmüller. $\beta^3 \kappa^3$.
1064. — *sudetica* Hänke.
 β . *remota* Fries. In einer Schlucht zwischen Deining und der Isar: Zuccarini. $\beta \kappa^3 \dagger$.
1065. — *trivialis* L. Wiesen und Wälder. $\beta^5 \kappa^5 \dagger$.
1066. — *pratensis* L. Wiesen. $\beta^5 \kappa^5 \dagger$.
1067. — *cenisia* All. Isarkies. $\beta \kappa^3 \dagger$.
 β . *pallesens* Koch. Ebenda.
1068. — *compressa* L. Kiesgruben, Wege und Felder.
 $\beta^4 \kappa^4 \dagger$.
 β . *Langeana* Koch. Isardämme: P.
1069. **Glyceria spectabilis** M. et Koch. Ufer und Gräben. $\beta^4 \kappa^3 \dagger$.
1070. — *fluitans* R. Br. Ufer, Gräben und Sümpfe.
 $\beta^5 \kappa^3 \dagger$.
1071. — *distans* Wahlenb. An Brücken und Mauern in der Stadt und in den Vorstädten. $\beta^4 \kappa^3 \dagger$.

1072. **Glyceria aquatica Presl.** An Ufern, Gräben und Sümpfen. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
1073. **Molinia coerulea Mönch.** Wiesen, Moore, Haiden und Auen. $\beta^5 \times^5 \dagger$.
 β . *altissima Link.* Im Waldschatten des Kapuzinerhölzl: P.
1074. **Dactylis glomerata L.** Wiesen. $\beta^5 \times^5 \dagger$.
1075. **Cynosurus cristatus L.** Wiesen. $\beta^5 \times^4 \dagger$.
1076. **Festuca ovina L.** Wiesen, Moore, Haiden, Auen, Aecker. $\beta^5 \times^5 \dagger$.
 α . *vulgaris Koch.*
 β . *valesiaca Koch.* Lichte Föhrenwälder bei Neuherberg.
 ϵ . *duriuscula Koch.* Biederstein, Sandgruben bei Blütenburg: P.
 ζ . *glauca Koch.* Menterschwaige: S., Biederstein, Neuherberg.
 η . *vaginata Koch.* Isarauen: v. Spitzl, Abhänge an der Isar: P.
1077. — *heterophylla Lam.* In den Wäldern z. B. bei Grünwald, Neuried und Thalkirchen. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
1078. — *rubra L.* Wälder und Haiden. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
 β . *villosa Koch.* Georgenschwaige: P.
1079. — *gigantea Vill.* Wälder und Hecken. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
1080. — *arundinacea Schreb.* Moore, Auen und Wiesen. $\beta^4 \times^4 \dagger$.
1081. — *elatior L.* Wiesen. $\beta^5 \times^5 \dagger$.
1082. — *loliacea Huds.* Theresienwiese gegen Untersending: M. $\beta \times^3$.

1083. **Brachypodium sylvaticum** R. et Sch. Wälder und Auen. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
1084. — *pinnatum* Beauv.
 α . *vulgare* Koch. Garching: E.
 β . *rupestre* Koch. Auf Haiden, Wiesen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
1085. **Bromus secalinus** L. Saatfelder. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
 β . *velutinus* Koch. Isarauen.
 γ . *muticus* Sendt. Hartmanshofen und Ramersdorf: S.; Perlach, Garching, Haimhausen: K.
1086. — *commutatus* Schrad. Bei der Glyptothek, in der Arcisstrasse: P. $\beta \alpha^2$.
1087. — *racemosus* L. Bei Biederstein auf Bauschutt: P. $\beta \alpha^2$.
1088. — *arvensis* L. Biederstein; Garching und Fröttmaning auf Feldern: S. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
1089. — *mollis* L. Wiesen, Felder und Wege. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
1090. — *asper* Murr. Wälder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
1091. — *sterilis* L. Auf Schutt und Neubrüchen. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
1092. — *tectorum* L. Wege, Kiesgruben, Felder. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
1093. **Triticum repens** L. Felder und Wege. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
1094. — *caninum* Schreb. Felder, Gebüsche, Hecken. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
1095. **Elymus europaeus** L. In den Wäldern von Grünwald und Bayerbrunn; Isarauen. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
1096. **Hordeum murinum** L. Strassengräben der Stadt und Vorstädte. $\beta^4 \alpha^3 \dagger$.
1097. **Lolium perenne** L. Wiesen, Haiden, Wege, Aecker. $\beta^5 \alpha^5 \dagger$.
 — *italicum* A. Br. Auf der Theresienwiese verwildert. M., P.

1098. **Lolium linicola** Sond. In Leinfeldern z. B. Grünwald: P.; nördliche Hügelreihe: K. $\beta^2 \times^4 \dagger$.
1099. — *temulentum* L. Garchingerhaide; in Feldern um Grünwald, Thalkirchen, Moosach, Biederstein und Garching. $\beta^3 \times^4 \dagger$.
1100. **Nardus stricta** L. Deininger-, Dachauer- und Erdingermoor. $\beta^4 \times^4 \dagger$.

III. Classe:

Acotyledoneae vasculares.

CVI. Ordnung: *Equisetaceae* DC.

1101. **Equisetum arvense** L. Wiesen und Aecker. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
1102. — *Telmateja* Ehrh. An waldigen Abhängen der Isar bei Heselohe, Grünwald. $\beta^2 \times^3 \dagger$.
1103. — *palustre* L. Sumpfige Wiesen und Moore z. B. Isarauen, Thalkirchen, Moosach. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
1104. — *limosum* L. Moore und Gräben z. B. Schleissheim, Starnberg. $\beta^4 \times^3 \dagger$.
1105. — *ramosum* Schleich. Im Dachauermoos, bei Hartmannshofen und am Fussweg nach Freimann: P. $\beta^2 \times^4 \dagger$.
1106. **Equisetum hyemale** L. Laubwälder im Isarthal bei Heselohe: P. $\beta \times^2 \dagger$.
1107. — *variegatum* Schleich. Am Isarkies. $\beta^2 \times^3 \dagger$.

CVII. Ordnung: *Lycopodiaceae* DC.

1108. **Lycopodium** *inundatum* L. Deiningermoor.
 $\beta \times^3 \dagger$.
1109. — *annotinum* L. Grünwalder Park: H. $\beta \times^3$.
1110. — *complanatum* L. In Wäldern bei Deining, Pullach, Grünwald und Haching. $\beta^3 \times^2 \dagger$.
1111. — *clavatum* L. Isarauen und Wälder z. B. bei Perlach. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
1112. **Selaginella** *spinulosa* Al. Br. Isarauen; Haiden bei Ismaning. $\beta^2 \times^4 \dagger$.
1113. — *helvetica* Spring. In Auen, auf Haiden, Triften und Aeckern. $\beta^4 \times^5 \dagger$.

CVIII. Ordnung: *Filices* L.

1114. **Botrychium** *Lunaria* Sw. Auf der Garchingerhaide; an den Abhängen der Isar bei Pullach: P. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
1115. **Polypodium** *vulgare* L. In den Wäldern der Isarabhänge u. der nördl. Hügelreihe. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
1116. — *Phegopteris* L. Im Grünwalderforst und auf der nördlichen Hügelreihe: E. $\beta^2 \times^2 \dagger$.
1117. — *Dryopteris* L. Bei Starnberg: Schonger; Deining gegen Schäftlarn: S.; Grünwalder Park: B., bei Grossheselohe: P. $\beta^3 \times^2 \dagger$.
1118. **Polypodium** *Robertianum* Hoffm. Isarabhänge. $\beta^3 \times^3 \dagger$.
1119. **Aspidium** *Lonchitis* Sw. In den Wäldern bei Pullach: S. $\beta \times^2 \dagger$.
1120. — *aculeatum* L. Wälder des Isarthals. $\beta^2 \times^2 \dagger$.

1121. **Polystichum Thelypteris** Roth. Zwischen Starnberg und Leutstetten: S. $\beta^2 \alpha^2$.
1122. — *Oreopteris* DC. Im Grünwalder Park: M. $\beta^2 \alpha^3 \dagger$.
1123. — *Filix mas* Roth. In Waldungen. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.
1124. — *spinulosum* DC. Im Deiningerfilz; in den Wäldern z. B. Schleissheim. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
1125. **Cystopteris fragilis** Bernh. Abhänge bei Grossheselohe; Starnberg bei den sieben Quellen: P. $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
1126. **Asplenium Filix femina** Bernh. Waldungen z. B. Grossheselohe und Pullach. $\beta^4 \alpha^4 \dagger$.
1127. — *Trichomanes* L. An den Abhängen der Isar $\beta^3 \alpha^3 \dagger$.
1128. — *viride* Huds. An den Abhängen der Isar. $\beta^3 \alpha^4 \dagger$.
1129. — *Ruta muraria* L. An alten Mauern und an den Nagelfluefelsen der Isarabhänge. $\beta^5 \alpha^3 \dagger$.
1130. — *septentrionale* Sw. An erratischen Blöcken bei Starnberg. $\beta \alpha$.
1131. **Pteris aquilina** L. In Wäldern z. B. bei Pullach; auf der nördlichen Hügelreihe. $\beta^5 \alpha^4 \dagger$.

BAYERISCHE
STAATS-
BIBLIOTHEK
MÜNCHEN

Verzeichniss der Pflanzenfamilien des Bezirkes und deren Artenzahl*).

Ranunculaceen	37	Rosaceen	42
Berberideen	1	Sanguisorben	4
Nymphaceen	2	Pomaceen	9
Papaveraceen	4	Onograriaceen	11
Fumariaceen	4	Haloragaceen	2
Cruciferen	42	Hippurideen	1
Cistaceen	1	Callitricheaceen	1
Violariaceen	8	Ceratophylleaceen	1
Resedaceen	2	Lythraceen	1
Droseraceen	3	Tamariscaceen	1
Polygaleen	4	Paronychiaceen	1
Sileneen	20	Scleranthaceen	1
Alsineen	20	Crassulaceen	5
Lineen	4	Grossulariaceen	2
Malvaceen	3	Saxifrageen	5
Tiliaceen	2	Umbelliferen	35
Hypericaceen	6	Araliaceen	1
Aceraceen	3	Corneen	1
Geraniaceen	10	Loranthaceen	1
Balsamineen	1	Caprifoliaceen	10
Oxalideen	1	Stellaten	16
Celastraceen	1	Valerianeen	6
Rhamneen	3	Dipsaceen	7
Papilionaceen	51	Compositen	137
Amygdaleen	3	Campanulaceen	11

*) Es sind nur die wildwachsenden Arten gezählt.

Vaccineen	4	Euphorbiaceen	10
Ericineen	4	Aristolochieen	1
Pyrolaceen	7	Urticeen	4
Monotropeen	1	Cupuliferen	4
Oleaceen	2	Salicineen	24
Asclepiadeen	1	Betulineen	5
Apocyneen	1	Coniferen	6
Gentianeen	12	Hydrocharideen	1
Convolvulaceen	6	Alismaceen	1
Boragineen	18	Butomeen	1
Solaneen	5	Juncagineen	2
Verbasceen	15	Potameen	11
Antirrhineen	28	Lemnaceen	4
Orobancheen	8	Thyphaceen	4
Rhinanthaceen	14	Aroideen	2
Labiaten	43	Orchideen	35
Verbenaceen	1	Irideen	4
Lentibularieen	5	Amaryllideen	2
Primulaceen	12	Asparageen	7
Globularieen	2	Liliaceen	17
Plantagineen	3	Colchicaceen	3
Amaranthaceen	2	Juncaceen	14
Chenopadeen	11	Cyperaceen	75
Polygoneen	20	Gramineen	80
Thymeleen	3	Equisetaceen	7
Santalaceen	5	Lycopodiaceen	6
Elaeagneen	1	Filices	18

102

Aus Versehen blieb aus:

Matricaria Chamomilla L. Auf Feldern; besonders häufig auf den Aeckern der nördlichen Hügelreihe.

$\beta^3 \times^3 \dagger$

was nach 433 eingereiht werden wolle.

Register der Genera.

	Pag.
Acer	14
Achillea	37
Aconitum	4
Acorus	72
Actaea	4
Adenostyles	34
Adonis	2
Adoxa	31
Aegopodium	28
Aethionema	8
Aethusa	29
Agrimonia	23
Agrostemma	11
Agrostis	84
Aira	85
Ajuga	60
Alchemilla	24
Alisma	70
Allium	76
Alnus	69
Alopecurus	84
Alsine	11
Alyssum	7
Amaranthus	62
Ampelopsis	15
Anacamptis	73
Anagallis	61
Anchusa	51
Andromeda	48

	Pag.
Andropogon	83
Anemone	1
Angelica	29
Anthemis	37
Anthericum	76
Anthoxanthum	84
Anthriscus	30
Anthyllis	17
Antirrhinum	54
Apera	84
Aposeris	42
Aquilegia	3
Arabis	5
Arctostaphylos	48
Arenaria	12
Arnica	37
Aronia	24
Arrhenatherum	85
Artemisia	37
Arum	72
Asarum	66
Asclepias	49
Asparagus	75
Asperula	32
Aspidium	91
Asplenium	91
Aster	35
Astragulus	18
Astrantia	28

	Pag.
Atriplex	63
Atropa	52
Avena	85
Ballota	60
Barbarea	5
Bartsia	57
Bellidiastrum	35
Bellis	35
Berberis	4
Berula	28
Betonica	59
Betula	68
Bidens	36
Biscutella	7
Blitum	63
Borago	51
Botrychium	90
Brachypodium	88
Brassica	6
Briza	86
Bromus	88
Bunias	8
Buphthalmum	36
Bupleurum	29
Butomus	70
Calamagrostis	84
Calamintha	58
Callitriche	26
Calluna	48
Caltha	3
Camelina	7
Campanula	47

	Pag.
Capsella	7
Cardamine	5
Carduus	40
Carex	80
Carlina	41
Carpinus	67
Carum	28
Caucalis	30
Centaurea	41
Centunculus	61
Cephalanthera	73
Cerastium	12
Ceratophyllum	26
Cerinthe	51
Chaerophyllum	30
Chelidonium	4
Chenopodium	62
Chondrilla	43
Chrysanthemum	37
Chrysosplenium	28
Cichorium	42
Cicuta	28
Cineraria	38
Circaea	25
Cirsium	38
Cladium	79
Clematis	1
Clinopodium	58
Cochlearia	7
Colchicum	77
Comarum	22
Conium	30

	Pag.		Pag.
Convallaria	76	Dryas	21
Convolvulus	50	Echium	51
Corallorrhiza	74	Elymus	88
Coriandrum	31	Epilobium	25
Cornus	31	Epipactis	74
Coronilla	19	Epipogium	73
Corydalis	4	Equisetum	89
Corylus	67	Erica	48
Cotoneaster	24	Erigeron	35
Crataegus	24	Eriophorum	79
Crepis	43	Erodium	15
Cuscuta	51	Erucastrum	6
Cynanchum	49	Ervum	19
Cynaglossum	51	Erysimum	6
Cynosurus	87	Erythraea	50
Cyperus	78	Eupatorium	34
Cystopteris	91	Euphorbia	66
Cypripedium	74	Euphrasia	57
Cytisus	16	Evonymus	16
Dactylis	87	Fagus	67
Daphne	65	Falcaria	28
Daucus	30	Festuca	87
Delphinium	3	Filago	36
Dentaria	6	Fragaria	22
Dianthus	10	Fraxinus	49
Digitalis	54	Fumaria	5
Diploaxis	6	Gagea	76
Dipsacus	34	Galanthus	75
Dorycnium	18	Galega	18
Draba	7	Galeobdolon	59
Dracocephalum	58	Galeopsis	59
Drosera	9	Galium	32

	Pag.		Pag.
Genista	16	Hydrocharis	69
Gentiana	50	Hyoscyamus	52
Geranium	15	Hypericum	14
Geum	21	Hypochoeris	42
Gladiolus	75	Jasione	46
Glechoma	59	Iberis	7
Globularia	62	Impatiens	15
Glyceria	86	Inula	36
Gnaphalium	36	Iris	75
Goodyera	74	Juncus	78
Gymnadenia	73	Juniperus	69
Gypsophila	10	Knautia	34
Hedera	31	Köleria	85
Heleocharis	79	Lactuca	43
Helianthemum	8	Lamium	59
Helleborus	3	Lappa	41
Helosciadium	28	Lapsana	41
Hemerocallis	77	Laserpitium	30
Heracleum	30	Lathraea	56
Herminium	73	Lathyrus	20
Herniaria	26	Leersia	84
Hesperis	6	Lemna	71
Hieracium	44	Leontodon	42
Hierochloa	83	Leonurus	60
Hippocrepis	19	Lepidium	7
Hippophaë	65	Leucojum	75
Hippuris	26	Libanotis	29
Holcus	85	Ligustrum	49
Holosteum	12	Lilium	76
Hordeum	88	Limosella	55
Humulus	66	Linaria	54
Hutchinsia	7	Linosyris	35

	Pag.		Pag.
Linum	13	Muscari	77
Listera	74	Myosotis	52
Lithospermum	52	Myosurus	2
Lolium	88	Myricaria	26
Lonicera	32	Myriophyllum	25
Lotus	18	Narcissus	75
Luzula	78	Nardus	89
Lychnis	11	Nasturtium	5
Lycopodium	90	Neottia	74
Lycopsis	51	Nepeta	58
Lycopus	58	Neslia	8
Lysimachia	61	Nuphar	4
Lythrum	26	Nymphaea	4
Majanthemum	76	Oenothera	25
Malachium	12	Onobrychis	19
Malaxis	74	Ononis	16
Malva	13	Onopordon	41
Matricaria	93	Ophrys	73
Medicago	17	Orchis	72
Melampyrum	56	Origanum	58
Melica	86	Ornithogalum	76
Melilotus	17	Orobanche	56
Melittis	59	Orobus	20
Mentha	57	Oxalis	16
Menyanthes	49	Panicum	83
Mercurialis	66	Papaver	4
Microstylis	74	Paris	75
Milium	85	Parnassia	9
Moehringia	12	Passerina	65
Molinia	87	Pastinaca	30
Monotropa	48	Pedicularis	57
Montia	26		


	Pag.		Pag.
Petasites	35	Pulmonaria	51
Peucedanum	29	Pyrola	48
Phalaris	83	Pyrus	24
Phleum	84	Quercus	67
Phragmites	85	Ranunculus	2
Physalis	52	Raphanus	8
Phyteuma	46	Reseda	9
Picris	42	Rhamnus	16
Pimpinella	28	Rhinanthus	57
Pinguicula	60	Rhynchospora	79
Pinus	69	Ribes	27
Pisum	19	Rosa	23
Plantago	62	Rubus	21
Platanthera	73	Rumex	63
Pleurospermum	31	Ruta	16
Poa	86	Sagina	11
Polemonium	50	Salix	67
Polycnemum	62	Salvia	58
Polygala	9	Sambucus	31
Polygonum	64	Sanguisorba	24
Polypodium	90	Sanicula	28
Polystichum	91	Saponaria	10
Populus	68	Sarothamnus	16
Potamogeton	70	Saxifraga	27
Potentilla	22	Scabiosa	34
Poterium	24	Scheuchzeria	70
Prenanthes	43	Schoenus	79
Primula	61	Scilla	76
Prunella	60	Scirpus	79
Prunus	20	Seleranthus	27
Pteris	91	Scorzonera	42
Pulicaria	36	Scrophularia	53

	Pag.
Scutellaria	60
Sedum	27
Selaginella	90
Selinum	29
Sempervivum	27
Senecio	38
Serratula	41
Seseli	29
Sesleria	85
Setaria	83
Sherardia	32
Silaus	29
Silene	11
Sisymbrium	6
Solanum	52
Solidago	35
Sonchus	43
Sorbus	24
Sparganium	71
Specularia	47
Spergula	11
Spiraea	20
Spiranthes	74
Stachys	59
Stellaria	12
Stenactis	35
Stratiotes	69
Sturmia	74
Succisa	34
Swertia	49
Symphythum	51
Tanacetum	37
Taraxacum	43
Tetragonolobus	18

	Pag.
Theucrium	60
Thalictrum	1
Thesium	65
Thlaspi	7
Thymus	58
Thysselinum	30
Tilia	14
Tofieldia	77
Torilis	30
Tragopogon	42
Trifolium	17
Triglochin	70
Triodia	85
Triticum	88
Trollius	3
Tunica	10
Turritis	5
Tussilago	34
Typha	71
Ulmus	66
Urtica	66
Utricularia	61
Vaccinium	47
Valeriana	33
Valerianella	33
Veratrum	77
Verbascum	52
Verbena	60
Veronica	54
Viburnum	32
Vicia	19
Vinca	49
Viola	8
Viscum	31
Zanichellia	71

ob





Kranz, Cajetan Anton,

Uebersicht der Flora von München enthaltend die in der Umgebung Münchens
wildwachsenden und verwilderten Gefässpflanzen

München 1859

Bavar. 1502 o

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10375689-8